

西濱快速公路(台61線)員林大排至西濱大橋新建工程計畫
水、陸域生態監測第1期工作 (187K-188.5K)

施工中第8季(100年10月~100年12月)生態監測報告

開發單位：交通部公路總局西部濱海公路中區工程處
執行監測單位：民翔環境生態研究有限公司
提送日期：中華民國100年12月

100 年第 4 季執行生態監測者簽名與蓋章

執行監測單位：民翔環境生態研究有限公司

陸域生態	監測者	<p>羅仁光 </p> <p>張學益  曾志明 </p>
	品保負責人	<p>張學益 </p>
水域生態	監測者	<p>吳國勳 </p>
	品保負責人	<p>張學益 </p>
水質	採樣者	<p>戴家偉 </p>
	檢驗者	<p>郭金山  陳均綺  陳美芳 </p>
	品保負責人	<p>劉美春 </p>
工地主任	<p>楊清偉 </p>	
負責人	<p>張學益 </p> <p></p>	

目 錄

目錄.....	I
表目錄.....	II
圖目錄.....	III
前言.....	1
第一章 監測內容概述	
1-1 工程進度.....	3
1-2 監測情形概述.....	4
1-3 監測計畫概述.....	4
1-4 監測位置.....	6
1-5 品保/品管作業措施概要.....	8
第二章 監測結果數據分析	
2-1 陸域生態.....	17
2-2 水域生態.....	60
第三章 檢討與建議	
3-1 監測結果檢討與因應對策.....	80
3-2 建議事項.....	81
參考文獻.....	86
附錄一、檢測執行單位之認證資料	
附錄二、採樣與分析方法	
附錄三、品保/品管查核記錄	
附錄四、原始數據	
附錄五、植物名錄	
附錄六、動物調查現況照片	

表 目 錄

表1-2、監測結果摘要.....	3
表1-3.1、水、陸域生態監測頻度及範圍.....	4
表1-3.2、監測範圍對照表.....	5
表1-5.2、水質檢驗項目、採樣及保存方法.....	9
表1-5.3、儀器維修校正項目及頻率.....	11
表1-5.4、水質分析項目及檢測方法.....	14
表2-1.1、植物歸隸特性.....	17
表2-1.2、植物樣區一植物計量.....	19
表2-1.3、植物樣區二植物計量.....	19
表2-1.4、植物樣區三植物計量.....	20
表2-1.5、植物樣區四植物計量.....	20
表2-1.6、植物樣區五植物計量.....	20
表2-1.7、植物物種比較表.....	21
表2-1.8、草生地樣區之草本植物物種歧異度.....	21
表2-1.9、陸域生態鳥類調查名錄.....	30
表2-1.10、施工中第8季一般鳥類調查結果.....	32
表2-1.11、施工中第8季水鳥調查結果.....	38
表2-1.12、本計畫與96年環評調查結果比較.....	43
表2-1.13、陸域生態哺乳類調查名錄.....	49
表2-1.14、施工中第8季哺乳類調查結果.....	50
表2-1.15、本計畫與96年環評調查結果比較.....	53
表2-1.16、陸域生態兩棲爬蟲類調查名錄.....	55
表2-1.17、施工中第8季兩棲爬蟲類調查結果.....	56
表2-1.18、本計畫與96年環評調查結果比較.....	59
表2-2.1、水域生態調查魚類資源.....	61
表2-2.2、本計畫與過去環評資料魚類資源比較表.....	62
表2-2.3、水域生態調查底棲生物資源.....	64
表2-2.4、本計畫與過去環評資料底棲生物比較表.....	65
表2-2.5、水域生態調查水生昆蟲資源.....	67
表2-2.6、施工中第8季水域生態調查水質分析表.....	71
表2-2.7、施工中第8季水質污染指標等級.....	73
表2-2.8、本計畫之福寶橋、福豐橋與過去差異分析、環評資料比較.....	74
表3-1.1、陸域鳥類歧異度指數表.....	82
表3-1.2、水鳥歧異度指數表.....	84

圖 目 錄

圖1-3、監測位置圖.....	6
圖1-4、水陸域調查樣線分布圖.....	7
圖1-5、工作流程及品保品管.....	8
圖2-1.1、自然度及植被分布圖.....	22
圖2-1.2、稀有、特殊或保育類鳥類出現位置及水鳥飛行路線圖.....	23
圖2-1.3、陸域鳥類歷季調查種類及數量.....	46
圖2-1.4、水鳥歷季調查種類及數量.....	47
圖2-1.5、歷季哺乳類調查種類及數量.....	53
圖2-1.6、歷季兩棲爬蟲類調查種類及數量.....	59
圖2-2.1福寶橋(舊濁水溪) 水質歷季與環評資料曲線圖.....	78
圖2-2.2福豐橋(漢寶溪) 水質歷季與環評資料曲線圖.....	78

前 言

一、依據

本處辦理之西濱快速公路(台61線)員林大排至西濱大橋新建工程環境影響說明書業奉行政院環境保護署97年11月4日環署綜字第0970085738號函有條件通過環境影響評估審查。目前98~100年本處辦理發包之工程標案計有7標，其施工範圍為本路段北端182K+720至195K+995(福興鄉至芳苑鄉)及南端209K+117至212K+700(大城鄉)。依據本路段環境影響說明書環境監測計畫表之規定，於各施工區段施工前需辦理各項環境監測，特定路段辦理生態監測、交通量調查及文化遺址監看。

二、監測執行期間

本路段因屬線性開發行為，工程施作模式為分階段施工及營運，預定以5處交流道為界分為5區段施工，為符合環境監測計畫表之規定，本處目前已發包施工(182K+720至195K+995及209K+117至212K+700)，已辦理北端182K+720至195K+995及南端209K+117至212K+700之施工中環境監測工作(目前發包施工標案部份已陸續完成全套管基樁、基礎、墩柱及進入上構橋梁施工階段，依規定地下水位觀測頻率為每月1次)，而182K+720至195K+995已進行施工中環境監測工作，187K-188.5K路段之施工中生態監測工作，台17線與員林大排及152線及148線(施工中)道路口交通量調查工作，監測執行期間：陸域(鳥類)生態監測原需於施工前1年開始至營運期開始5年，後經本處陳報變更對照表送行政院環境保護署審查，經環境保護署環評大會審查通過，同意將監測期限變更為施工前半年開始至營運期開始5年半。其餘於施工前半年至營運期開始1年，文化遺址監看部分則於工程基樁基礎施工時請專家學者監看(目前監看路段為WH50-1標基礎施作部份為194K+800~195K+800)。

文化遺址監測路段	施工監測情形	備 註
188k+500~189k+500	已完成監看	—
194k+800~195k+800	監看中	—
197k+200~197k+600	—	未發包施工
208k+000~208k+800	—	未發包施工
210k+700~211k+700	已完成監看	—

三、執行監測單位

- 1.開發單位：交通部公路總局西部濱海公路中區工程處。
- 2.182K+720~190K+024.487環境監測工作監測廠商：建利環保顧問股份有限公司。
- 3.209K+117~212K+700環境監測工作監測廠商：景泰環保科技股份有限公司。
- 4.187K~188.5K生態監測廠商：民翔環境生態研究有限公司。
- 5.台17線與員林大排及152縣道路口交通量調查工作調查廠商：東山科技有限公司。
- 6.190K+024.487~209K+117環境監測及交通量調查工作：亞太環境科技股份有限公司。
- 7.北端之188K+500~189K+500及南端之210K+700~211K+700文化遺址工作監測廠商：中央研究院。

本冊報告書係屬187K-188.5K生態監測施工中第8季(100年10月至12月)報告，屬施工中監測階段。

第一章

監測內容概述

1-1 工程進度

本路段因屬線性開發行為，工程施作模式為分階段施工及營運，預定以5處交流道為界分為5區段施工，為符合環境監測計畫表之規定，本處目前已發包施工(182K+720至195K+995及209K+117至212K+700)，已辦理北端182K+720至195K+995及南端209K+117至212K+700之施工中環境監測工作，190K+024.487~193K+270(WH50標)漢寶-新生新建工程之施工前、施工中監測工作，187K-188.5K路段之施工中生態監測工作，台17線與員林大排及152線道及148線道(施工中)路口交通量調查工作。目前已完成至100年第4季(100年10月~100年12月)之監測工作。

各 標 案 工 程 里 程	預定進度(%)	實際進度(%)	備 註
182K+720-184K+820(WH49標)	61.36	59.50	施工中
184K+820-187K+910(WH49-1標)	66.35	66.55	施工中
187K+910-190K+024.487(WH49-2標)	61.14	71.10	施工中
190K+024.487-193K+270(WH50標)	24.91	35.76	施工中
193K+270-195K+995(WH50-1標)	44.56	48.68	施工中
195K+995-199K+780(WH50-2標)	—	—	未發包施工
199K+780-202K+940(WH51標)	—	—	未發包施工
202K+940-204K+900(WH51-1標)	—	—	未發包施工
204K+900-208K+378(WH52標)	—	—	未發包施工
208K+378-209K+117(WH53A標)	—	—	未發包施工
209K+117-210K+522(WH53B標)	69.39	68.97	施工中
210K+522-212K+700(WH53-1標)	68.95	71.15	施工中

施工中第9季(101年1月~3月)之監測工作將按計畫持續進行，監測報告因資料頗多，故依各監測區段監測結果分冊裝訂，方便各單位閱覽。

本冊監測報告內容為187k-188.5k有關陸域生態、水域生態、水質之監測結果資料。

1-2 監測情形概述

本次為施工中第8季陸域動物、植物、水域動物與水質監測，執行鳥類、哺乳類、兩棲爬蟲類、魚類、水生昆蟲、蝦蟹貝類、水質等項目之調查，調查結果概述如表1-2所示。

表 1-2、監測結果摘要

監測類別	監測地點	監測結果摘要	因應對策
生態調查	陸域生態 (鳥類)	施工中第8季調查共發現9目25科58種8162隻次。	—
	陸域生態 (哺乳類)	施工中第8季調查共發現2目2科3種83隻次。	—
	陸域生態 (兩棲爬蟲類)	施工中第8季調查共發現3目5科6種153隻次。	—
	陸域生態 (植物)	施工中第8季調查共發現53科121屬138種。	—
	水域(魚類)	施工中第8季調查共發現2目3科4種30尾。	—
	水域 (蝦蟹貝類)	施工中第8季調查共發現5目10科11種84隻。	—
	水域 (水生昆蟲)	施工中第8季調查未發現任何水生昆蟲。	—
	水域(水質)	根據河川污染指標(RPI)計算，福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)與漢寶溪中游測站水質為嚴重污染等級；而裕農橋(舊濁水溪上游)、福豐橋(漢寶溪下游)測站水質則為中度污染等級。	—

1-3 監測計畫概述


本計畫之工作內容包括陸域生物(植物、鳥類、哺乳類、兩棲爬蟲類)、水域生物(魚類、蝦蟹貝類、水生昆蟲)及水質等。計畫工程為3136個日曆天，監測頻率、範圍如表1-3.1、表1-3.2所示。

表 1-3.1、水陸域生態監測頻率及範圍

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間
生態調查	陸域生態	<p>一般鳥類、哺乳類、兩棲爬蟲類：計畫路線(182.7k~188.5k)左右500m內設5條樣線</p> <p>黑翅鳶：187k~188.5k</p> <p>計畫路線左右設5條樣線，樣線1~3為計畫路線左右2km範圍內(依環評承諾)，樣線4為計畫路線左右500m內，樣線5為計畫路線東側1km(與計畫路線平行)。</p> <p>水鳥：漢寶村大同路海尾出入海管制站以北，漢寶海堤以東魚塢。</p> <p>植物：計畫路線左右500m內分別於5條樣線各設1樣點。</p>	<p>每月1次，每次2天(植物每次1天)</p>	<p>動物：穿越線調查法。</p> <p>植物：固定樣區調查法。</p>	民翔環境生態研究有限公司	<p>一般鳥類、哺乳類、兩棲爬蟲類：</p> <p>100/10/11~12</p> <p>100/11/9~10</p> <p>100/12/7~8</p> <p>黑翅鳶：</p> <p>100/10/11~12</p> <p>100/11/9~10</p> <p>100/12/7~8</p> <p>水鳥：</p> <p>100/10/11~12</p> <p>100/11/9~10</p> <p>100/12/7~8</p> <p>植物：</p> <p>100/10/12</p> <p>100/11/10</p> <p>100/12/8</p>
	水域生態	<p>福寶橋-舊濁水溪</p> <p>福豐橋-漢寶溪</p>	每季1次	<p>蝦蟹類、魚類：手撈網捕撈</p> <p>貝類、水生昆蟲：圓柱筒取樣</p>	民翔環境生態研究有限公司	100/11/21
	水質	<p>福寶橋-舊濁水溪</p> <p>福豐橋-漢寶溪</p>	每季1次	<p>NIEA W217.51A</p> <p>NIEA W424.52A</p> <p>NIEA W421.57C</p> <p>NIEA W510.54B</p> <p>NIEA W516.54A</p> <p>NIEA W210.57A</p> <p>NIEA W203.51B</p> <p>NIEA W447.20C</p> <p>電位計法</p> <p>NIEA W448.51B</p> <p>NIEA W330.52A</p> <p>NIEA W306.52A</p> <p>NIEA W306.52A</p> <p>NIEA W306.52A</p> <p>NIEA W306.52A</p> <p>NIEA W306.52A</p> <p>NIEA E202.53B</p> <p>NIEA W406.52C</p> <p>NIEA W219.52C</p>	台灣世曦工程顧問股份有限公司	100/11/21

表 1-3.2、監測範圍對照表

項目	測定參數	監測地點	監測頻率	對應監測點樁
空氣品質	<ul style="list-style-type: none"> 懸浮微粒(TSP,PM₁₀) 二氧化硫(SO₂) 氮氧化物(NO,NO₂) 一氧化碳(CO) 臭氧(O₃)、鉛(Pb) 落塵量、風速、風向 	<ul style="list-style-type: none"> 北極宮(福興鄉) 王功國小(芳苑鄉) 西港國小(大城鄉) 	<ul style="list-style-type: none"> 施工前半年每季一次 施工期間每季一次 營運期一年內每季一次 	<ul style="list-style-type: none"> 186K+300 196K+050 209K+900
噪音振動	<ul style="list-style-type: none"> 營建工程噪音(L_{eq}、L_{max}) 	<ul style="list-style-type: none"> 工區周界1公尺處 	<ul style="list-style-type: none"> 施工期間每兩週一次 	各工程標案
	<ul style="list-style-type: none"> 環境噪音振動(L_{eq}、L_{max}、L_x) 	<ul style="list-style-type: none"> 北極宮(福興鄉) 王功國小(芳苑鄉) 復興宮(芳苑鄉) 三師廟(大城鄉) 	<ul style="list-style-type: none"> 施工前半年每季一次 施工期間每季一次 營運期一年內每季一次 	<ul style="list-style-type: none"> 186K+300 196K+050 199K+800 209K+140
地面水質	<ul style="list-style-type: none"> 工區放流水(水溫,真色色度,油脂,pH,SS,BOD,COD,NH₃-N) 	<ul style="list-style-type: none"> 各標段工區放流口 	<ul style="list-style-type: none"> 施工期間每月一次 	各工程標案。
	<ul style="list-style-type: none"> 河川水質(水溫,比導電度,總磷,大腸桿菌群,水溫,真色色度,油脂,pH,DO,SS,Pb,BOD,COD,NO₃-N) 	<ul style="list-style-type: none"> 福寶橋(舊濁水溪) 福豐橋(漢寶溪) 王功橋(後港溪) 永興橋(二林溪) 西港橋(魚寮溪) 	<ul style="list-style-type: none"> 施工前半年每季一次 施工期間每季一次 營運期一年內每季一次 	<ul style="list-style-type: none"> 185K+100 188K+100 196K+200 200K+500 208K+800
地下水	<ul style="list-style-type: none"> 地下水水位觀測 	於各個施工標分別設一個監測點	<ul style="list-style-type: none"> 施工前半年每季一次 施工中每季一次 營運期一年內每季一次 	各工程標案。
生態調查	<ul style="list-style-type: none"> 陸域生態(鳥類) 	<ul style="list-style-type: none"> 生態敏感區路段： 187-188.5k 197-200.5k 201-208k 	<ul style="list-style-type: none"> 施工前一年至開始營運五年內每月一次 進行範圍及方式 	<ul style="list-style-type: none"> 187-188.5k 197-200.5k 201-208k
	<ul style="list-style-type: none"> 水域生態 	<ul style="list-style-type: none"> 福寶橋(舊濁水溪) 福豐橋(漢寶溪) 王功橋(後港溪) 永興橋(二林溪) 西港橋(魚寮溪) 	<ul style="list-style-type: none"> 施工前半年內每季一次 施工期間每季一次 營運期一年內每季一次 	<ul style="list-style-type: none"> 185K+100 188K+100 196K+200 200K+500 208K+800
交通流量	<ul style="list-style-type: none"> 路口交通量 道路服務水準 	<ul style="list-style-type: none"> 台17與員林大排 台17與148縣道 台17與150縣道 台17與152縣道 	<ul style="list-style-type: none"> 施工前半年每季一次 施工期間每季一次 營運期一年內每季一次 	<ul style="list-style-type: none"> 182K+720 195K+960 200K+600 209K+700
文化遺址	<ul style="list-style-type: none"> 古蹟、遺址、特殊建築物古物 	<ul style="list-style-type: none"> 在計畫路線鄰近下列區域南北側各500公尺內： 彰化漢寶疑似遺址 東王功橋北側田地 福海宮東北側田地 西港橋北側田地 頂庄橋東側田地 	<ul style="list-style-type: none"> 於指定監測範圍內全套管基樁鑽掘階段請專家監看： 基礎開挖期間，配合開挖進度持續監看至該開挖完成。 基樁鉗掘期間，監看頻率為每週一 	<ul style="list-style-type: none"> 188.5K-189.5K。 194.8K-195.8K。 197.2K-197.6K。 208K-208.8K。 210.7K-211.7K。



註：本計畫路線環境監測依上圖粗線範圍計分為5標，①182K+720-190K+024.487②190K+024.487-195K+995③195K+995-202K+940④202K+940-209K+117⑤209K+117-212K+700。交通量調查計分為2標，①台17線與員林大排及152線路口②台17線與148線及150線路口。生態監測計分為3標，①187K-188.5K②197K-200.5K③201K-208K。文化遺址監看分為5處①188.5K-189.5K②194.8K-195.8K③197.2K-197.6K④208K-208.8K⑤210.7K-211.7K。

圖1-3、監測位置圖

註：1.本計畫路線環境監測依上圖粗線範圍計分為5標，①WH49標至WH49-2標②WH50標至WH50-1標③WH50-2標至WH51標④WH51-1標至WH53A標⑤WH53B標至WH53-1標。交通量調查計分為2標，①台17線與員林大排及152線路口②台17線與148線及150線路口。生態監測計分為3標，①187K-188.5K②197K-200.5K③201K-208K。文化遺址監看分為5處①188.5K-189.5K②194.8K-195.8K③197.2K-197.6K④208K-208.8K⑤210.7K-211.7K。

1-4 監測位址

本計畫之調查樣線如圖1-4所示：




圖1-4、水陸域調查樣線分布圖

1-5 品保/品管作業措施概要

1-5.1 現場採樣之品保/品管




圖1-5 工作流程及品保品管

1-5.2 分析工作之品保/品管

表 1-5.2 水質檢驗項目、採樣及保存方法(1/2)

檢驗項目	水樣最少需要量(mL)	容器	保存方法	最長保存期限
溫度	1000	—	—	現場測定
pH值	300	玻璃或塑膠瓶	—	現場測定
溶氧(DO) (疊氮化物修正法)	300	BOD瓶	—	現場測定
導電度	500	—	若採樣後無法在 24小時內測定完成，應立即以 0.45 μ m之濾膜過濾後，4 $^{\circ}$ C 冷藏並避免與空氣接觸	—
鹽度	500	—	—	現場測定
氧化還原電位	300	—	—	現場測定
生化需氧量(BOD)	1000	玻璃或塑膠瓶	暗處，4 $^{\circ}$ C 冷藏	48小時
化學需氧量(COD)	100	玻璃或塑膠瓶	加 硫酸 使 水 樣 之 pH<2，暗處，4 $^{\circ}$ C 冷藏	7 天
氨氮	500	玻璃或塑膠瓶	加 硫酸 使 水 樣 之 pH<2。暗處，4 $^{\circ}$ C 冷藏。水樣中含有餘氯，則應於採樣現場加入去氯試劑。	7 天
懸浮固體(SS)	500	玻璃或塑膠瓶	暗處，4 $^{\circ}$ C 冷藏	7 天
濁度	100	玻璃或塑膠瓶	暗處，4 $^{\circ}$ C 冷藏。	48小時
氯鹽	50	使用清潔並經試劑水清洗過之塑膠瓶或玻璃瓶。在取樣前，採樣瓶可用擬採集之水樣洗滌二至三次。	—	28天

表 1-5.2 水質檢驗項目、採樣及保存方法(2/2)

檢驗項目	水樣最少 需要量(mL)	容 器	保 存 方 法	最長保存期限
大腸桿菌群	250	無菌袋或玻璃瓶	暗處,4°C 冷藏	24小時
一般金屬 (銅、鋅、鎳、鉛、錳)	200	以1+1硝酸洗淨之塑膠瓶	加硝酸使水樣之pH<2(若測定溶解性金屬,須於採樣後立刻以0.45μm之薄膜濾紙過濾,並加硝酸使濾液之pH<2)。	6個月
汞	500	預先以低汞含量濃硝酸或超純濃硝酸(1+1)溶液洗淨之下列容器： 1.石英或鐵氟龍(TFE) 2.聚丙烯或聚乙烯材質且具聚乙烯蓋之容器。 3.硼矽玻璃材質之容器。	添加濃硝酸使水樣之pH值小於2，加酸後之水樣宜貯藏於約4°C。或每1L水樣中添加2mL含20%(W/V)重鉻酸鉀之低汞含量濃硝酸或超純濃硝酸溶液(1:1)，並置於無污染之冷藏庫(4°C)中保存。	若水樣中含數mg/L濃度之汞時，其保持穩定之期限為35天，但當水樣中汞濃度僅為0.001mg/L範圍時，應於採樣後儘速分析。

1-5.3 儀器維修校正項目及頻率

表1-5.3 儀器維修校正項目及頻率(1/3)

儀器名稱	測試項目	頻率	注意事項	備註
分析天平 (Precisa 180A、METTLER B204-S、SARTORIUS LA130S-F)	內校	每次	使用者執行	--
	刻度校正	每月	儀器負責人執行	記錄
	重複性校正	六個月	儀器負責人執行	記錄
	維護 (清潔、乾燥、水平)	每日	使用者執行	儀器負責人檢查
		每月	乾燥劑更換、水平度	--
	重複性、線性量測	三年	儀器負責人聯絡工研院量測技術發展中心	校正記錄保存
	砝碼	三年	儀器負責人送工研院量測技術發展中心	校正記錄保存
上皿天平 (Precisa 3000D)	內校	每次	使用者執行	--
	刻度校正	每月	儀器負責人執行	記錄
	重複性校正	六個月	儀器負責人執行	記錄
	維護 (清潔)	每日	使用者執行	儀器負責人檢查
	重複性、線性量測	三年	儀器負責人聯絡工研院量測技術發展中心	校正記錄保存
	砝碼	三年	儀器負責人送工研院量測技術發展中心	校正記錄保存
pH 計 (WTW330i、WTW720)	校正：準確度	使用前	使用者執行	記錄
導電度計 (WTW cond330i、YSI85)	校正：準確度	使用前	儀器保管人配0.01M KCl溶液由使用者校正	記錄
	全刻度校正	一年	儀器保管人配0.1、0.01、0.001N KCl溶液校正	記錄
BOD培養箱 (Firstek RI-101)	校正：溫度	每日	值班人員記錄	記錄

表1-5.3 儀器維修校正項目及頻率(2/3)

儀器名稱	測試項目	頻率	注意事項	備註
烘箱 (Mettler U-30)	校正：溫度變化	每日	值班人員記錄	記錄
	校正：烘箱內使用位置之溫度變化	二年	檢驗員	記錄
冰箱 (歌林、三洋)	校正：溫度	每日	值班人員記錄	記錄
樣品冷藏櫃 (Firstek CC-35、WISDOM MD-303)	校正：溫度	每日	值班人員記錄	記錄
溫度計 (AMA)	參考溫度計(外部校正)	十年	送工研院量測技術發展中心	保存記錄
	參考溫度計(內部校正)	半年	儀器負責人執行	記錄
	工作溫度計(內部校正)	半年	儀器負責人執行	記錄
氧化還原電位計 (WTW330i)	校正：準確度	使用前	使用者執行	記錄
排煙櫃 (三雄 HD-001-7)	抽氣量檢查	每季	保管人執行	--
濁度計 (HACH /USA 2100N)	全刻度校正	一年	儀器保管人執行(福馬林標準液)	記錄
分光光度計 (HITACHI U-2001)	維護：清潔	每月	保管人清潔積垢	--
	開機測試	使用前	熱機30分鐘，全程掃瞄	--
	吸光值校正	每季	儀器商以標準件執行	保存記錄
原子吸收光譜儀 (火焰式) (PERKIN ELMER 700)	靈敏度	使用前	檢驗員	--
	靈敏度校正	每二年	PE 廠商	保存記錄
	更換：5支預濾管匣、粒狀活性碳、壓塊活性碳	每季	儀器商更換	維護記錄
	更換：三合一混床樹脂、最終過濾器	半年	儀器商更換	維護記錄
	更換：RO膜管匣、最終活性碳	一年	儀器商更換	維護記錄

表1-5.3 儀器維修校正項目及頻率(3/3)

儀器名稱	測試項目	頻率	注意事項	備註
SmartPark DQ-3去離子 水機 (MILLIPORE SmartPark DQ-3)	更換：5支預濾管 匣、粒狀活性炭、 壓塊活性炭	每季	儀器商更換	維護記錄
	更換：三合一混床 樹脂、最終過濾器	半年	儀器商更換	維護記錄
	更換：RO膜管匣、 最終活性炭	一年	儀器商更換	維護記錄
玻璃器皿(含 玻璃量瓶、玻 璃移液管、玻 璃滴定管等)	標示體積	一年	測定人員	記錄
過濾設備(微 生物濾膜法) (秦宏)	標示體積	一年	測定人員	記錄

1-5.4 分析項目之檢測方法

本計畫水質之分析方法，主要依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，分析項目及檢測方法如表1-5.4。

表1-5.4 水質分析項目及檢測方法

分析項目	檢 測 方 法	單 位	方法偵測極限	重覆分析 (RPD%)	添加分析 (回收率%)	查核分析 (回收率%)
溫度	NIEA W217.51A	°C	—	±0.5°C [◆]	—	—
pH值	NIEA W424.52A	—	—	±0.2 [◆]	—	—
溶氧量(DO)	NIEA W421.57C	mg/L	0.1	≤20	—	—
導電度	NIEA W203.51B	μmho/cm	—	±3% [▼]	—	—
鹽度	NIEA W447.20C	psu	—	≤1	—	—
氧化還原電位	電位計法	mv	—	±20mv [◆]	—	—
生化需氧量 (BOD)	NIEA W510.54B	mg/L	1.0	≤20	—	80~120
化學需氧量 (COD)	NIEA W515.54A	mg/L	1.8	≤20	80~120	80~120
高鹵化學需氧量	NIEA W516.54A	mg/L	2.0	≤20	80~120	80~120
氨氮	NIEA W448.51B	mg/L	0.02	≤20	80~120	80~120
懸浮固體(SS)	NIEA W210.57A	mg/L	0.5	≤10	—	—
濁度	NIEA W219.52C	NTU	0.05	≤20	—	95~105
氯鹽	NIEA W406.52C	mg/L	1.8	≤20	80~120	80~120
大腸桿菌群	NIEA E202.53B	CFU/100mL	—	0.4 [★]	—	—
鋅	NIEA W306.52A	mg/L	0.01	≤20	80~120	80~120
銅	NIEA W306.52A	mg/L	0.01	≤20	80~120	80~120
錳	NIEA W306.52A	mg/L	0.02	≤20	80~120	80~120
鎘	NIEA W306.52A	mg/L	0.006	≤20	80~120	80~120
鉛	NIEA W306.52A	mg/L	0.08	≤20	80~120	80~120
汞	NIEA W330.52A	mg/L	0.0003	≤20	80~120	80~120

註: 1.◆指重複分析值中，最大值與最小值之差異值。

2.▼指重複分析值中，最大值與最小值之相對差異百分比。

3.★重複分析值分別取對數值，其對數值差異範圍須<0.4。

1-5.5 數據處理原則

水、陸域生態

水、陸域生態中，其隻次為每月調查記錄相加所得；植物部份，覆蓋度為某物種所佔面積與樣區面積之比例，以百分比表示；植物歧異度指數(S、 λ 、H'、N1、N2及E5)、陸域動物歧異度指數、多樣性指數、均勻度指數與豐富度等計算方法如附錄二所示。

水質

有效測值定義為實際得到的檢驗數據的數目與品管人員確認可接受數據的數目之比較，以數據的完整性用百分比表示，一般水質完整性要求標準訂為95%以上，ND值將以「ND<方法偵測極限值」表示，平均值採算術平均方式，若平均數據中有部分為ND值時，則平均值將以「ND<方法偵測極限值」表示，有效數字以三位數為原則，並採四捨五入進位方式。

第二章

環境監測數據分析

第二章 監測結果數據分析

2-1 陸域生態調查結果

一、植物

1. 植物種類及統計

本季調查共計發現植物 53 科 121 屬 138 種。在調查所發現的植物中，草本植物有 83 種(佔 60.15%)，灌木類有 15 種(佔 10.87%)，藤本植物有 18 種(佔 13.04%)，喬木類植物有 22 種(佔 15.94%)；在屬性方面，原生種有 82 種(佔 59.85%)，歸化種有 31 種(佔 22.46%)，栽培種有 25 種(佔 18.16%)。就類群而言，蕨類植物 4 科 4 屬 4 種，裸子植物 3 科 3 屬 3 種，雙子葉植物 40 科 91 屬 106 種，單子葉植物 6 科 23 屬 25 種(植物名錄見附錄五，物種歸隸特性統計詳見表 2-1.1)。

計畫預定地內多為農耕地及草生地，植被覆蓋度低，受到人為干擾較多，主要種植的作物有稻、西瓜、蔬菜等，取決於人類之經濟需求不同，其種植之作物會有所不同，而自生型的植物以草本植物為主，多生長於道路邊緣，其中以大花咸豐草、墨西哥向日葵、象草、銀膠菊及葎草為優勢，因在計畫預定地內以人為干擾嚴重的土地為主，故在地景及植被組成上不豐富。

表2-1.1、植物歸隸特性

歸隸特性		蕨類植物		裸子植物		雙子葉植物		單子葉植物		總計	
		100年 第3季	100年 第4季								
類別	科數	4	4	3	3	38	40	6	6	51	53
	屬數	4	4	3	3	88	91	23	23	118	121
	種數	4	4	3	3	103	106	25	25	135	138
生長習性	草本	4	4	0	0	59	60	19	19	82	83
	灌木	0	0	1	1	11	12	2	2	14	15
	藤本	0	0	0	0	17	17	1	1	18	18
	喬木	0	0	2	2	16	17	3	3	21	22
屬性	特有	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	原生	4	4	1	1	59	61	16	16	80	82
	歸化	0	0	0	0	30	30	1	1	31	31
	栽培	0	0	2	2	14	15	8	8	24	25

2. 稀特有植物

調查中並無發現『環保署植物生態評估技術規範』，訂定為稀有或瀕臨絕滅之植物，亦未發現特有植物。

3. 土地利用類型及自然度分佈(圖 2-1.1)

- 人工林(自然度 3)：
此類植被分佈在農耕地周圍與道路邊，以木麻黃及黃槿為主。
- 草生地及農耕地(自然度 2)：
計畫區土地利用以此類型為主，以西瓜、象草、田菁及稻為多數。
- 裸露地(自然度 0)：
此區分佈於計畫區工地，目前因進行人為的植被移除，造成此區目前呈現地表裸露之情形。
- 人工建物(自然度 0)：
屬於人類活動所造成之無植被區，包含都市、房舍、道路及橋樑等人工設施，是所有自然度最低之區域，其中可見園藝植物栽植其內。

4. 資料分析

● 樣區組成及優勢度分析

計畫區位於彰化縣福興鄉與芳苑鄉，屬濱海地區，計畫區內木本植物以木麻黃、黃槿及榕樹為多，前兩種為一般防風林主要組成物種，後者為一般平地常見樹種；草本植物則以墨西哥向日葵、大花咸豐草、銀膠菊、象草及葎草為優勢，墨西哥向日葵為栽培種，主要分佈於漢寶濕地一帶，大花咸豐草、銀膠菊、象草及葎草則為低海拔常見之物種，在預定地內主要生長於道路邊緣。依計畫區內植被分佈現況，隨機取樣劃設5個大小為1x2平方公尺的草本樣區，其調查結果分析如下：

樣區一：本樣區位於陸域樣線一西側，海拔高度為 8m。草本植物包括燈籠草、野萵菜、牛筋草、大花咸豐草、龍爪茅、小飛揚草、紅花野牽牛、落葵、海濱狗尾草及短角苦瓜，其中以大花咸豐草為優勢(相對優勢度為 70.97%)(表 2-1)。歧異度 H' 為 1.42；種數 S 為 10 種，其餘歧異度 λ 、 N_1 、 N_2 及均勻度($E5$)分別為 0.41、4.15、2.45 及 0.46(表 2-1)，因季節變化及各物種生長速率不同，草本歧異度呈自然波動，各季略有增減，但未有異常的變動。

樣區二：本樣區位於陸域樣線二西側，海拔高度為 7m。草本植物包括大花咸豐草、葎草、墨西哥向日葵、銀膠菊、田菁、紅花野牽牛、象草及小葉藜，其中以大花咸豐草為優勢(相對優勢度為 68.75%)(表 2-1)，歧異度 H' 為 1.04；種數 S 為 8 種，其餘歧異度 λ 、 N_1 、 N_2 及均勻度($E5$)分別為 0.51、2.84、1.96 及 0.52(表 2-1)；在本季因季節變化及各物種生長速率不同，草本歧異度呈自然波動，各季略有增減，且在 11 月時有輕微人為擾動，但影響不大。

樣區三：本樣區位於陸域樣線三東側，海拔高度為 7m。草本植物包括大花咸豐草、象草、葎草、銀膠菊及紅花野牽牛，其中以象草為優勢(相對優勢度均為 70.53%)(表 2-1)，歧異度 H' 為 0.73；種數 S 為 4 種，其餘歧異度 λ 、 N_1 、 N_2 及均勻度($E5$)分別為 0.57、2.07、1.76 及 0.71(表 2-1)；本季發現部份樣區遭強風所挾帶的沙土覆蓋，故樣區內植物覆蓋度降低。

樣區四：本樣區位於陸域樣線四東側，海拔高度為 6m。草本植物組成包括大花

咸豐草、墨西哥向日葵、葎草、銀膠菊、暎穗蓼及小藜，其中以大花咸豐草為優勢(相對優勢度均為60%)(表2-1)。歧異度 H' 為1.08；種數 S 為6種，其餘歧異度 λ 、 N_1 、 N_2 及均勻度(E5)分別為0.44、2.94、2.26及0.65(表2-1)；本季因季節變化及各物種生長速率不同，導致覆蓋率與上季有所增減，但未有異常現象。

樣區五：本樣區位於陸域樣線五東側，海拔高度為5m。草本植物包括大花咸豐草、白茅、蘆葦、大黍、紅花野牽牛及天花，其中以蘆葦為優勢(相對優勢度均為58.70%)(表2-1)，歧異度 H' 為0.98；種數 S 為5種，其餘歧異度 λ 、 N_1 、 N_2 及均勻度(E5)分別為0.45、2.68、2.21及0.72(表2-1)；因7月遭人為干擾導致覆蓋度下降，但8、9月已慢慢升高。

樣區一~五皆處於道路旁，日照時間長故以常見的大花咸豐草與墨西哥向日葵為優勢，各樣區的覆蓋度亦因季節變換而提高許多，但各樣區歧異度變化並不大；樣區優勢種的相對優勢度高且均勻度中等，在本季與上季的各數據相比較下無較大的變動。

表 2-1.2、植物樣區一植物計量

種 類	草本植物					
	100年7月	100年8月	100年9月	100年10月	100年11月	100年12月
	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)
燈籠草	1	2	1	1	1	2
野苧菜	4	5	4	4	7	5
牛筋草	8	7	12	8	8	4
大花咸豐草	70	72	69	66	65	62
龍爪茅	7	6	9	7	6	4
小飛揚草	2	2	1	2	2	3
紅花野牽牛	1	1	1	1	2	2
落葵	2	2	1	2	4	6
海濱狗尾草	2	2	2	2	2	1
短角苦瓜					3	11

表 2-1.3、植物樣區二植物計量

種 類	草本植物					
	100年7月	100年8月	100年9月	100年10月	100年11月	100年12月
	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)
大花咸豐草	48	55	40	55	40	55
紅花野牽牛	2	3	2	1	1	1
葎草	14	12	10	12	10	15
墨西哥向日葵	25	18	15	18	5	2
銀膠菊	3	4	4	6	4	2
田菁	1	1	1	2	2	3

象草	3	3	1	2	2	1
小葉藜	4	4	2	1	1	1

表 2-1.4、植物樣區三植物計量

種 類	草本植物					
	100年7月	100年8月	100年9月	100年10月	100年11月	100年12月
	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)
大花咸豐草	15	28	18	20	24	25
象草	62	65	53	65	66	67
銀膠菊	3	3	2	1	2	2
紅花野牽牛	1	2	4	1	1	1

表 2-1.5、植物樣區四植物計量

種 類	草本植物					
	100年7月	100年8月	100年9月	100年10月	100年11月	100年12月
	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)
大花咸豐草	23	21	30	50	55	60
墨西哥向日葵	48	40	20	12	7	4
葎草	19	28	42	28	25	28
銀膠菊	5	5	3	4	3	2
睫穗蓼	1	2	2	2	4	4
小藜	4	4	3	2	2	2

表 2-1.6、植物樣區五植物計量

種 類	草本植物					
	100年7月	100年8月	100年9月	100年10月	100年11月	100年12月
	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)	覆蓋度(%)
大花咸豐草	2	8	14	28	30	30
蘆葦	2	12	30	45	50	54
白茅	1	2	3	3	3	3
大黍	1	2	2	3	3	2
紅花野牽牛	3	2	2	2	2	3

5.與上季資料比較

本季較上季新增2科3屬3種，分別為益母草、檉樹及辣椒，後兩者為人工栽植，前者則為低海拔常見物種，至本季共計發現植物53科121屬138種；計畫區內部份農耕地因季節變換處休耕狀態；因季節變換故各草本樣區內各物種覆蓋度略有增減，但優勢種的相對優勢度仍然較高，故歧異度並無明顯的改變，計畫區內自生型草本植物仍是以大花咸豐草為主。

6.與96年「西濱快速公路員林大排至西濱大橋新建工程」環境影響說明書調查成果比較

此計畫與民國96年西濱快速公路員林大排至西濱大橋新建工程案所記錄的植物進行比較(表4.2)，兩次調查所記錄物種皆以濱海常見物種及農作物為主，在96年調查有發現稀特有植物-蘭嶼羅漢松，種植於民宅庭園內，非天然分布，本次調查則未發現稀特有植物；在96年與本次調查中也未發現計畫區中具有老樹。

表2-1.7、植物物種比較表

案名	員林大排至西濱大橋段生態監測 (98-100)	西濱快速公路員林大排至西濱大橋新 建工程 (96)
木本植物	木麻黃、黃槿、榕樹、構樹	構樹、銀合歡
草本植物	大花咸豐草、墨西哥向日葵、葎草、 象草、銀膠菊、野萵菜	大黍、葎草、大花咸豐草、苧麻、巴拉 草、象草
稀特有 植物	未發現	蘭嶼羅漢松 (民宅庭園栽植，而非天然分布)
老樹	未發現	未發現

7.歧異度分析


草本植物樣區為一般道路邊緣草生地，其日照時間長、較乾燥且人為干擾嚴重，故植物種類較少，而優勢集中於少數種，故歧異度較低(表 2-1.8)。

表2-1.8、草生地樣區之草本植物物種歧異度

樣區\草本 植物	種數S				歧異度H'				歧異度λ				歧異度N ₁				歧異度N ₂				均勻度E5			
	100 年 第一 季	100 年 第二 季	100 年 第三 季	100 年 第四 季																				
樣區一	9	9	9	10	0.87	0.85	0.99	1.42	0.60	0.60	0.50	0.41	2.38	2.34	2.70	4.15	1.67	1.66	2.00	2.45	0.49	0.49	0.59	0.46
樣區二	8	8	8	8	1.29	1.28	1.39	1.04	0.37	0.41	0.35	0.51	3.64	3.59	4.02	2.84	2.68	2.43	2.88	1.96	0.64	0.55	0.62	0.52
樣區三	4	4	4	4	0.91	0.77	0.85	0.73	0.48	0.59	0.53	0.57	2.50	2.16	2.33	2.07	2.08	1.71	1.88	1.76	0.72	0.61	0.66	0.71
樣區四	6	6	6	6	1.24	1.08	1.34	1.08	0.34	0.46	0.31	0.44	3.45	2.96	3.80	2.94	2.96	2.15	3.24	2.26	0.80	0.59	0.80	0.65
樣區五	6	6	5	5	1.12	1.14	1.09	0.98	0.41	0.38	0.43	0.45	3.07	3.11	2.97	2.68	2.46	2.63	2.34	2.21	0.71	0.77	0.68	0.72



圖 2-1.1、自然度及植被分布圖



圖例

- | | | | |
|-------|---------------------|---|------|
| — — — | 台61線計畫路線 | A | 黑翅鳶 |
| | 陸域動物調查樣線(編號1~5) | B | 紅隼 |
| | 水鳥調查樣線(編號1~5) | D | 燕鴿 |
| ——— | 生態敏感區段(187K至188.5K) | F | 紅尾伯勞 |
| ↔ | 水鳥飛行路線 | H | 眼鏡蛇 |



圖 2-1.2 稀有、特殊或保育類鳥類出現位置及水鳥飛行路線圖

二、鳥類

鳥類調查分一般鳥類及水鳥調查，其中一般鳥類調查共分陸域樣線1~5等五個調查樣線；水鳥調查共分水鳥調查樣線1~5等五個調查樣線。施工中第8季調查共記錄鳥類9目25科58種8162隻次，其中記錄一般鳥類8目23科42種3309隻次，水鳥調查樣線則記錄鳥類5目14科36種4853隻次。

(一)、一般鳥類調查

1.種屬組成

本季一般鳥類調查共記錄8目23科42種3309隻次(表2-1.10)，發現物種包括鷺科的中白鷺、小白鷺、黃頭鷺、夜鷺；鷺鷹科的黑翅鳶；隼科的紅隼；秧雞科的紅冠水雞；長腳鷸科的高蹺鷸；燕鵻科的燕鵻；鴿科的小環頸鴿、太平洋金斑鴿、小辮鴿；鷸科的黑腹濱鷸、長趾濱鷸、田鷸、鷹斑鷸、青足鷸、小青足鷸、反嘴鷸；鳩鴿科的珠頸斑鳩、紅鳩、野鳩；雨燕科的小雨燕；翠鳥科的翠鳥；百靈科的小雲雀；燕科的家燕、洋燕；鵲鴿科的大花鵲、西方黃鵲鴿；鶇科的白頭翁；伯勞科的紅尾伯勞、棕背伯勞；鶇科的鶇鶇、黃尾鶇；扇尾鶇科的灰頭鶇、褐頭鶇；繡眼科的綠繡眼；梅花雀科的斑文鳥；麻雀科的麻雀；八哥科的白尾八哥、家八哥；卷尾科的大卷尾。

2.特化性物種

在特化物種方面，本季調查並未發現特有種，特有亞種則有小雨燕、白頭翁、褐頭鶇與大卷尾等4種，佔本季調查記錄物種的9.5%。

3.保育等級

本季調查期間發現2種珍貴稀有的保育類動物(黑翅鳶、紅隼)，以及2種其他應予保育的保育類動物(燕鵻、紅尾伯勞)，保育鳥類共記錄4種(圖2-1.2)，佔本季發現物種的9.5%。

4.優勢種群

本季一般鳥類調查結果中，數量較多的物種分別為麻雀(1183隻次)、紅鳩(623隻次)與黃頭鷺(368隻次)，分別佔出現數量的35.8%、18.8%與11.1%。麻雀、紅鳩與黃頭鷺為平原地區常見鳥類，適應性強，可棲居在高度人為干擾之地區。

5.遷移習性

本季共記錄42種鳥類，其中包含留鳥18種，夏候鳥2種，冬候鳥9種，過境鳥1種，兼具夏、冬候鳥性質者1種，兼具留鳥與候鳥性質者2種，兼具候鳥與過境鳥性質者5種，兼具留鳥與過境鳥性質者2種，兼具留、候鳥與過境鳥性質者2種，各屬性鳥種種數分別佔發現物種的42.9%、4.8%、21.4%、2.4%、2.4%、4.8%、11.9%、4.8%與4.8%。

6.與上季資料比較

本季監測共記錄一般鳥類8目23科42種3309隻次，上一季監測則記錄8目21科32種2588隻次；兩季共同出現物種有26種，相似度為54.2%，僅在上季有記錄之物種為栗小鷺、緋秧雞、彩鷸、番鵪、黃頭扇尾鶇與棕扇尾鶇等6種，而本季較

上季新增記錄中白鷺、夜鷺、紅隼、太平洋金斑鴿、小辮鴿、黑腹濱鴿、長趾濱鴿、田鴿、青足鴿、小青足鴿、反嘴鴿、翠鳥、小雲雀、大花鸚、鵲鴿與黃尾鴿等16種。

7.與歷年同季資料比較

98年第4季監測記錄45種3279隻次，99年第4季監測記錄30種1947隻次，而本季記錄42種3309隻次，發現物種以98年第4季為最多，而數量則以本季為最多。

本季與99年第4季為施工中階段監測，98年第4季為施工前監測，施工後監測與施工前比較，種類與數量方面呈現一波動起伏的現象，工程進行所產生的噪音、人為干擾等，造成在施工後的鳥類數量有減少的趨勢。然而，本季調查結果較99年第4季調查的種類與數量增加，顯示此區域的留鳥已有較適應的情形。此外，各年間的候鳥停留與否、天候狀況、農事活動等也是影響調查結果的因素。

8.各樣線鳥類調查概況如下：

[陸域樣線1]

本季調查共記錄5目15科22種483隻次，記錄物種包括中白鷺、小白鷺、黃頭鷺、黑翅鳶、紅隼、高蹺鴿、珠頸斑鳩、紅鳩、野鴿、家燕、大花鸚、西方黃鸚、白頭翁、紅尾伯勞、棕背伯勞、黃尾鴿、褐頭鷓鴣、綠繡眼、麻雀、白尾八哥、家八哥、大卷尾等。發現之白頭翁、褐頭鷓鴣與大卷尾等3種為特有亞種，佔本樣線出現種類的13.6%。本季調查發現2種珍貴稀有之保育類動物(黑翅鳶與紅隼)，1種其他應予保育之保育類動物(紅尾伯勞)，保育類物種佔出現種類的13.6%。數量較多的物種為黃頭鷺(120隻次)，佔出現數量的24.8%。本樣線環境除聚落外，主要是由農地所構成，本季發現物種以平原性鳥種(如黃頭鷺、麻雀、紅鳩等)為主。

[陸域樣線2]

本季調查共記錄5目13科16種448隻次，記錄物種包括黃頭鷺、紅冠水雞、珠頸斑鳩、紅鳩、小雨燕、洋燕、西方黃鸚、白頭翁、紅尾伯勞、棕背伯勞、褐頭鷓鴣、綠繡眼、麻雀、白尾八哥、家八哥、大卷尾等。發現物種中，小雨燕、白頭翁、褐頭鷓鴣與大卷尾等4種屬特有亞種，佔本樣線出現種類的25.0%。本季調查發現1種其他應予保育之保育類動物(紅尾伯勞)，保育類物種佔出現種類的6.3%。數量較多的物種為麻雀(170隻次)，佔出現數量的37.9%。本樣線環境除聚落外，主要是由農地所構成，本季發現物種以平原性鳥種(如麻雀、紅鳩等)為主。

[陸域樣線3]

本季調查共記錄4目15科24種846隻次，記錄物種包括小白鷺、黃頭鷺、高蹺鴿、小環頸鴿、太平洋金斑鴿、黑腹濱鴿、田鴿、青足鴿、小青足鴿、珠頸斑鳩、紅鳩、小雲雀、家燕、洋燕、西方黃鸚、白頭翁、紅尾伯勞、棕背伯勞、褐頭鷓鴣、斑文鳥、麻雀、白尾八哥、家八哥、大卷尾等。白頭翁、褐頭鷓鴣與大卷尾等3種為特有亞種，佔本樣線出現種類的12.5%。本季調查發現1種其他應予保育之保育類動物(紅尾伯勞)，保育類物種佔出現種類的4.2%。本樣線數量較多的物種為麻雀(490隻次)，佔發現數量的57.9%。本樣線環境除聚落外，主要是由農地所構成，本季發現物種以平原性鳥種(如麻雀、紅鳩等)為主。

[陸域樣線4]

本季調查共記錄4目14科20種436隻次，記錄物種包括小白鷺、黃頭鷺、高蹺鴿、燕鴿、小環頸鴿、田鴿、反嘴鴿、紅鳩、野鴿、家燕、洋燕、西方黃鵪鴿、白頭翁、紅尾伯勞、灰頭鷓鴣、褐頭鷓鴣、麻雀、白尾八哥、家八哥、大卷尾等。白頭翁、褐頭鷓鴣與大卷尾等3種為特有亞種，佔本樣線出現種類的15.0%。保育類物種方面，本季調查發現2種其他應予保育之保育類動物(燕鴿、紅尾伯勞)，保育類物種佔出現種類的10.0%。數量較多的物種為麻雀(115隻次)，佔出現數量的26.4%。本樣線環境除聚落外，主要是由農地所構成，本季發現物種以平原性鳥種(如麻雀、紅鳩等)為主。

[陸域樣線5]

本季調查共記錄5目18科32種1096隻次，記錄物種包括小白鷺、黃頭鷺、夜鷺、高蹺鴿、燕鴿、小環頸鴿、小辮鴿、黑腹濱鴿、長趾濱鴿、田鴿、鷹斑鴿、青足鴿、小青足鴿、珠頸斑鳩、紅鳩、野鴿、翠鳥、小雲雀、家燕、洋燕、西方黃鵪鴿、白頭翁、紅尾伯勞、棕背伯勞、鵲鴿、灰頭鷓鴣、褐頭鷓鴣、斑文鳥、麻雀、白尾八哥、家八哥、大卷尾等。本樣線發現特有亞種包括白頭翁、褐頭鷓鴣與大卷尾等3種，佔出現種類的9.4%。保育類物種方面，本季調查發現2種其他應予保育之保育類動物(燕鴿、紅尾伯勞)，保育類物種佔出現種類的6.3%。數量最多的物種為麻雀(290隻次)，佔出現數量的26.5%。本樣線環境除聚落外，主要是由農地及少部份漁塭所構成，本季發現物種以平原性鳥種(如麻雀、紅鳩等)為主。

(二)、水鳥調查

1. 種屬組成

本季調查共記錄鳥類5目14科36種4853隻次(表2-1.11)，發現物種包括鷺鶯科的小鷺鶯；鷺科的蒼鷺、大白鷺、小白鷺、黃頭鷺、夜鷺；長腳鴿科的高蹺鴿；鴿科的東方環頸鴿、小環頸鴿、鐵嘴鴿、蒙古鴿、太平洋金斑鴿、灰斑鴿；鴿科的翻石鴿、黑腹濱鴿、彎嘴濱鴿、紅胸濱鴿、三趾濱鴿、大杓鴿、中杓鴿、磯鴿、青足鴿、小青足鴿、反嘴鴿；鳩鴿科的紅鳩；燕科的洋燕、棕沙燕；鵪鴿科的大花鵪、西方黃鵪鴿；鶉科的白頭翁；伯勞科的紅尾伯勞、棕背伯勞；鶉科的藍磯鶉；扇尾鶉科的褐頭鷓鴣；麻雀科的麻雀；八哥科的家八哥。其中鳩鴿科、燕科、鵪鴿科、鶉科、伯勞科、鶉科、扇尾鶉科、麻雀科及八哥科等雖非水鳥，惟在水鳥樣線調查中若有目擊，亦一併納入。

2. 特化性物種

在特化物種方面，本季調查並未發現特有種，特有亞種則有白頭翁與褐頭鷓鴣2種，佔本季記錄物種的5.6%。

3. 保育等級

本季調查期間發現1種其他應予保育的保育類動物(紅尾伯勞)，保育鳥類共記錄1種(圖2-1.2)，佔本季發現物種的2.8%。

4. 優勢種群

本季水鳥調查結果中，數量較多的物種分別為東方環頸鴿(2350隻次)、黑腹濱鴿(733隻次)與小白鷺(361隻次)，分別佔出現數量的48.4%、15.1%與7.4%。東

方環頸鵒、黑腹濱鵒與小白鷺為魚塢、濕地等環境普遍常見的冬候鳥與留鳥。

5.遷移習性

本季水鳥調查共記錄36種鳥類，其中包含留鳥9種，冬候鳥11種，過境鳥1種，兼具夏、冬候鳥性質者1種，兼具留鳥與候鳥性質者5種，兼具候鳥與過境鳥性質者7種，兼具留鳥、候鳥與過境鳥性質者2種，各屬性鳥種分別佔發現物種的25.0%、30.6%、2.8%、2.8%、13.9%、19.4%與5.6%。

6.與上季資料比較

本季監測共記錄鳥類5目14科36種4853隻次，上一季監測則記錄6目16科33種3024隻次；兩季共同出現的物種有23種，相似度為51.1%，僅在上季有記錄之物種為中白鷺、紅冠水雞、黃足鵒、小燕鷗、燕鷗、翠鳥、家燕、灰頭鷓鴣與大卷尾等9種，本季較上季新增記錄大白鷺、小環頸鵒、灰斑鵒、黑腹濱鵒、彎嘴濱鵒、紅胸濱鵒、大杓鵒、青足鵒、棕沙燕、大花鵒、西方黃鵠與藍磯鶇等12種。

7.與歷年同季資料比較

98年第4季監測記錄27種3588隻次，99年第4季監測記錄34種4588隻次，本季記錄36種4853隻次。各年間同季比較，發現種類與數量皆以本季為最多，呈現一逐漸上升的現象。各年間的種類及數量的差異上多以候鳥為主，而候鳥容易受到當年的天候狀況影響，導致停留的時間不同而造成調查結果有所差異；此外，調查期間的漁塢養殖活動也會影響當次的調查結果。

8.各樣線鳥類調查概況如下：

[水鳥樣線1]

本季調查共記錄4目9科12種159隻次，記錄物種包括蒼鷺、大白鷺、小白鷺、高蹺鵒、紅鳩、洋燕、白頭翁、紅尾伯勞、棕背伯勞、褐頭鷓鴣、麻雀與家八哥等。發現物種中，白頭翁與褐頭鷓鴣2種屬特有亞種，佔本樣線出現種類的16.7%。本季調查記錄1種其他應予保育之保育類動物(紅尾伯勞)，保育類物種佔出現種類的8.3%。數量最多的物種為小白鷺(50隻次)，佔出現數量的31.4%。本樣線環境除聚落外，主要是由漁塢所構成，本季發現物種以小白鷺、麻雀為主。

[水鳥樣線2]

本季調查共記錄4目9科10種76隻次，記錄物種包括大白鷺、小白鷺、高蹺鵒、小環頸鵒、磯鶇、紅鳩、白頭翁、藍磯鶇、麻雀與家八哥等。發現物種中，白頭翁1種屬於特有亞種，佔本樣線所出現種類的10.0%。保育類物種方面，本季調查未發現任何保育類動物。數量最多的物種為小白鷺(22隻次)，佔出現數量的28.9%。本樣線環境除聚落外，主要是由漁塢所構成，本季發現物種以常見的小白鷺為主。

[水鳥樣線3]

本季調查共記錄5目11科21種1336隻次，記錄物種包括蒼鷺、大白鷺、小白鷺、黃頭鷺、夜鷺、高蹺鵒、東方環頸鵒、鐵嘴鵒、太平洋金斑鵒、灰斑鵒、翻石鵒、黑腹濱鵒、磯鶇、青足鵒、小青足鵒、紅鳩、洋燕、棕沙燕、白頭翁、褐頭鷓鴣與麻雀等。發現物種中，白頭翁與褐頭鷓鴣2種屬於特有亞種，佔本樣線所出現種類的9.5%。本季調查未發現任何保育類動物。數量最多的物種為東方環頸鵒(750隻次)，佔出現數量的56.1%。本樣線環境除聚落外，主要是由漁塢所構

成，本季發現物種以常見的東方環頸鴿、翻石鴿為主。

[水鳥樣線4]

本季調查共記錄5目9科23種2823隻次，記錄物種包括小鷺鶯、蒼鷺、大白鷺、小白鷺、夜鷺、高蹺鴿、東方環頸鴿、鐵嘴鴿、蒙古鴿、太平洋金斑鴿、灰斑鴿、翻石鴿、黑腹濱鴿、彎嘴濱鴿、紅胸濱鴿、三趾濱鴿、大杓鴿、中杓鴿、磯鴿、反嘴鴿、紅鳩、洋燕與麻雀等。本季調查未發現任何保育類動物。數量最多的物種為東方環頸鴿(1400隻次)，佔出現數量的49.6%。本樣線環境主要是由海堤外的溼地以及海堤內的魚塭所構成，本季發現物種以常見的東方環頸鴿、黑腹濱鴿等為主。

[水鳥樣線5]

本季調查共記錄4目8科18種459隻次，記錄物種包括蒼鷺、大白鷺、小白鷺、黃頭鷺、夜鷺、高蹺鴿、東方環頸鴿、鐵嘴鴿、翻石鴿、黑腹濱鴿、大杓鴿、磯鴿、小青足鴿、紅鳩、洋燕、大花鸚、西方黃鸚與麻雀等。本季調查未發現任何保育類動物。數量最多的物種為東方環頸鴿(200隻次)，佔出現數量的43.6%。本樣線環境主要是由海堤外的溼地以及海堤內的魚塭所構成，本季發現物種以東方環頸鴿、黑腹濱鴿等為主。

(三)、與施工前階段資料比較

施工前監測階段共進行3季次的調查，調查時間為98年4~12月，共記錄鳥類11目32科71種。施工中監測階段自99年1月起，至本季共進行8季次調查，發現鳥類計有11目32科84種。目前為止，兩階段共同發現的物種計有64種，物種相似度為70.3%。黃小鷺、斑尾鴿、台灣夜鷹、赤腰燕、白鸚、遠東樹鷺與白喉文鳥等7種僅在施工前階段記錄；而施工中階段新增的物種有小水鴨、赤頸鴨、灰胸秧雞、田鴿、反嘴鴿、大濱鴿、紅腹濱鴿、長趾濱鴿、尖尾濱鴿、紅領瓣足鴿、大杓鴿、赤足鴿、小青足鴿、白翅黑燕鷗、燕鷗、銀鷗、大花鸚、白腹鸚、鸚與黃尾鸚等20種。施工後，新增物種之原因除監測調查時間包含冬、春季等候鳥大量來台的時間外，天候狀況、農事活動也是影響調查結果之因素。

(四)、與96年環境影響說明書調查結果比較

96年環評調查結果，共記錄鳥類33科104種，本計畫目前共執行11季的調查，總共發現鳥類34科91種(表2-1.12)。其中，僅在96年調查有發現的鳥類為紫鷺、尖尾鴨、鳳頭潛鴨、東方澤鷺、北雀鷹、灰面鵟鷹、遊隼、半蹼鴿、黑尾鴿、鵝、小濱鴿、寬嘴鴿、小杓鴿、小黑背鷗、黑嘴鷗、鷗嘴燕鷗、黑腹燕鷗、中杜鵑、短耳鴉、紅尾鸚、漠即鳥、粉紅鸚嘴、東方大葦鷺、極北柳鷺、喜鸚等25種，而本計畫較環評結果新增栗小鷺、黃小鷺、緋秧雞、灰胸秧雞、燕鴿、燕鷗、銀鷗、野鴿、台灣夜鷹、藍磯鸚、鸚與黃頭扇尾鷺等12種。96年環評調查記錄較多種鳥類，除了與不同年間的天候狀況有關以外，調查範圍的不同也是造成此差異的原因。

(五)、黑翅鳶

本季10~12月的調查中，分別記錄黑翅鳶2、3、3隻次，總計共發現8隻次。在本

季的調查中，僅樣線1有發現黑翅鳶的紀錄，顯示本樣線為黑翅鳶穩定的活動區域。本季調查期間，於10月份與12月份發現黑翅鳶有築巢的行為，但10月份所築的巢位，在11月份調查時發現親鳥已棄巢，而12月份則於另一棵木麻黃上築巢，後續繁殖情形將持續觀察。本地區近年來雖有黑翅鳶築巢之記錄，但人為干擾、捕捉過於嚴重，導致黑翅鳶之繁殖成功率偏低，影響黑翅鳶在此地區之族群數量。若樣線1~5中未發現黑翅鳶蹤跡，則於預定路線189K至西濱大橋路段持續搜尋黑翅鳶。

表2-1.9、陸域生態鳥類調查名錄(1/2)

目名	科名	中文名	學名	特化性	保育等級	遷移習性	
鷺鷥目	鷺鷥科	小鷺鷥	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			普遍留鳥/普遍冬候鳥	
鵞形目	鵞科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>			普遍冬候鳥	
		大白鷺	<i>Ardea alba</i>			普遍冬候鳥/稀有夏候鳥	
		中白鷺	<i>Mesophoyx intermedia</i>			普遍冬候鳥/稀有夏候鳥	
		小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>			普遍留鳥/不普遍冬候鳥/普遍過境鳥	
		黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>			普遍留鳥	
		夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>			普遍留鳥/稀有冬候鳥/稀有過境鳥	
		栗小鷺	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>			不普遍留鳥	
	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>			普遍留鳥/普遍夏候鳥		
	鵞科	埃及聖鵞	<i>Threskiornis aethiopicus</i>			不普遍引進種	
雁形目	雁鴨科	赤頸鴨	<i>Anas penelope</i>			普遍冬候鳥	
		小水鴨	<i>Anas crecca</i>			普遍冬候鳥	
鷹形目	鷲鷹科	黑翅鷲	<i>Elanus caeruleus</i>		II	稀有留鳥	
	隼科	紅隼	<i>Falco tinnunculus</i>		II	普遍冬候鳥	
鵝形目	三趾鶉科	棕三趾鶉	<i>Turnix suscitator</i>	Es		普遍留鳥	
	秧雞科	白腹秧雞	<i>Amaurornis phoenicurus</i>			普遍留鳥	
		紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>			普遍留鳥	
		緋秧雞	<i>Porzana fusca</i>			普遍留鳥	
		灰胸秧雞	<i>Gallirallus striatus</i>	Es		不普遍留鳥	
鵝形目	彩鵝科	彩鵝	<i>Rostratula benghalensis</i>		II	普遍留鳥	
	長腳鵝科	高蹺鵝	<i>Himantopus himantopus</i>			普遍冬候鳥/不普遍留鳥	
	燕鵝科	燕鵝	<i>Glareola maldivarum</i>		III	普遍夏候鳥	
	鵝科	東方環頸鵝	<i>Charadrius alexandrinus</i>				普遍冬候鳥/不普遍留鳥
		小環頸鵝	<i>Charadrius dubius</i>				普遍冬候鳥/稀有留鳥
		鐵嘴鵝	<i>Charadrius leschenaultii</i>				普遍過境鳥/不普遍冬候鳥
		蒙古鵝	<i>Charadrius mongolus</i>				普遍過境鳥/不普遍冬候鳥
		太平洋金斑鵝	<i>Pluvialis fulva</i>				普遍冬候鳥
		灰斑鵝	<i>Pluvialis squatarola</i>				普遍冬候鳥
		小瓣鵝	<i>Vanellus vanellus</i>				不普遍冬候鳥
	鵝科	翻石鵝	<i>Arenaria interpres</i>				普遍冬候鳥
		尖尾濱鵝	<i>Calidris acuminata</i>				普遍過境鳥
		黑腹濱鵝	<i>Calidris alpina</i>				普遍冬候鳥
		紅腹濱鵝	<i>Calidris canutus</i>				不普遍過境鳥
		彎嘴濱鵝	<i>Calidris ferruginea</i>				稀有冬候鳥/普遍過境鳥
		紅胸濱鵝	<i>Calidris ruficollis</i>				普遍冬候鳥
		長趾濱鵝	<i>Calidris subminuta</i>				不普遍冬候鳥
		大濱鵝	<i>Calidris tenuirostris</i>				不普遍過境鳥
		三趾濱鵝	<i>Calidris alba</i>				不普遍冬候鳥
		田鵝	<i>Gallinago gallinago</i>				普遍冬候鳥
		斑尾鵝	<i>Limosa lapponica</i>				不普遍過境鳥/稀有冬候鳥
		大杓鵝	<i>Numenius arquata</i>				不普遍冬候鳥
		中杓鵝	<i>Numenius phaeopus</i>				普遍過境鳥/不普遍冬候鳥
		黃足鵝	<i>Tringa brevipes</i>				普遍過境鳥
		鷹斑鵝	<i>Tringa glareola</i>				普遍冬候鳥/普遍過境鳥
		磯鵝	<i>Actitis hypoleucos</i>				普遍冬候鳥
		青足鵝	<i>Tringa nebularia</i>				普遍冬候鳥
小青足鵝	<i>Tringa stagnatilis</i>				不普遍冬候鳥/普遍過境鳥		
赤足鵝	<i>Tringa totanus</i>				普遍冬候鳥		
反嘴鵝	<i>Xenus cinereus</i>				不普遍過境鳥		
紅領瓣足鵝	<i>Phalaropus lobatus</i>				普遍過境鳥		

表2-1.9、陸域生態鳥類調查名錄(2/2)

目名	科名	中文名	學名	特化性	保育等級	遷移習性	
	鷗科	白翅黑燕鷗	<i>Chlidonias leucopterus</i>			普遍過境鳥/稀有冬候鳥	
		小燕鷗	<i>Sternula albifrons</i>		II	不普遍夏候鳥/不普遍留鳥	
		燕鷗	<i>Sterna hirundo</i>			普遍過境鳥	
		銀鷗	<i>Larus argentatus</i>			不普遍冬候鳥	
鴿形目	鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>			普遍留鳥	
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>			普遍留鳥	
		野鳩	<i>Columba livia</i>			普遍留鳥	
鴉形目	杜鵑科	番鴉	<i>Centropus bengalensis</i>			普遍留鳥	
夜鷹目	夜鷹科	台灣夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>	Es		普遍留鳥	
雨燕目	雨燕科	小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	Es		普遍留鳥	
佛法僧目	翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>			普遍留鳥/不普遍過境鳥	
雀形目	百靈科	小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>			普遍留鳥	
	燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>			普遍夏候鳥/普遍冬候鳥/普遍過境鳥	
		赤腰燕	<i>Cecropis striolata</i>			普遍留鳥	
		洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>			普遍留鳥	
		棕沙燕	<i>Riparia paludicola</i>			普遍留鳥	
	鵲鴿科	赤喉鵲	<i>Anthus cervinus</i>			不普遍冬候鳥	
		大花鵲	<i>Anthus richardi</i>			不普遍冬候鳥	
		白鵲鴿	<i>Motacilla alba</i>			普遍留鳥/普遍冬候鳥	
		西方黃鵲鴿	<i>Motacilla flava</i>			普遍冬候鳥/普遍過境鳥	
	鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	Es		普遍留鳥	
	伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>			III	普遍冬候鳥/普遍過境鳥
		棕背伯勞	<i>Lanius schach</i>				普遍留鳥
	鶇科	鶇鴿	<i>Copsychus saularis</i>				稀有引進種
		黃尾鶇	<i>Phoenicurus aureus</i>				不普遍冬候鳥
	鶇科	藍磯鶇	<i>Monticola solitarius</i>				普遍冬候鳥/稀有留鳥
		斑點鶇	<i>Turdus eunomus</i>				不普遍冬候鳥
		白腹鶇	<i>Turdus pallidus</i>				普遍冬候鳥
	樹鶯科	遠東樹鶯	<i>Cettia canturians</i>				不普遍冬候鳥
	扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	<i>Cisticola exilis</i>		Es		不普遍留鳥
		棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>				普遍留鳥/稀有過境鳥
		灰頭鶇鶯	<i>Prinia flaviventris</i>				普遍留鳥
		褐頭鶇鶯	<i>Prinia inornata</i>		Es		普遍留鳥
	繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>				普遍留鳥
	鶇科	黑臉鶇	<i>Emberiza spodocephala</i>				普遍冬候鳥
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>				普遍留鳥
		白喉文鳥	<i>Euodice malabarica</i>				不普遍引進種
	麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>				普遍留鳥
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>				普遍引進種	
	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>				普遍引進種	
卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>		Es		普遍留鳥/稀有過境鳥	
12 目	34 科	91 種		8 種	6 種		

註 1：特化性一欄「Es」指台灣特有亞種。

2：保育等級一欄「II」屬於珍貴稀有之二級保育類動物；「III」屬於應予保育的三級保育類動物。

3：保育類野生動物名錄依農委會於 97 年 7 月 2 日公告修正。

表2-1.10、施工中第8季一般鳥類調查結果(1/6)

中文名	樣線 1											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
小鷺鶒	2				2							
蒼鷺			12									
大白鷺		1	6									
中白鷺											6	
小白鷺	12	15	22		10		3	2	2		15	
黃頭鷺	88	32	11	8	47	35	18	24	27	17	120	
夜鷺	4	5	3			2	2	2				
栗小鷺		1										
黃小鷺		1										
黑翅鳶	2	3	2	8	6	6	6	6	5	6	8	
紅隼				1			2				2	
棕三趾鶉		2				2	1					
白腹秧雞					1							
紅冠水雞	4	3	1	6	1			1	1			
緋秧雞		2										
灰胸秧雞					2							
高蹺鴿	4	6	2		11	5					19	
燕鴿					6							
東方環頸鴿		1										
小環頸鴿		3	2									
小辮鴿			35				26					
尖尾濱鴿					7							
鷹斑鴿	7	1										
磯鴿		4	3									
小青足鴿					3							
小燕鷗	5											
珠頸斑鳩				2	3	2	4	8	3	5	4	
紅鳩	160	193	254	139	145	166	121	182	174	154	111	
野鴿	13	43							10		14	
番鴿	3	4	1		1	1			2			
小雨燕			3									
翠鳥		1	1	2								
小雲雀	3			4	4			2				
家燕	146	119	34		36	16	6		21	23	5	
洋燕		22	16	5		12	12	17	5	5		
棕沙燕			11									
赤喉鸚			28									
大花鸚											4	
西方黃鸚鵡	5		33	2			21	10			7	
白頭翁	106	60	63	29	28	23	18	21	30	18	16	
紅尾伯勞	1	4	12	2			3	1		2	4	
棕背伯勞	5	7	5	5	7	7	5	4	2	6	1	
黃尾鸚				3			1				1	
藍磯鸚			1									
黃頭扇尾鷺									1			

表2-1.10、施工中第8季一般鳥類調查結果(2/6)

中文名	樣線 1										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
棕扇尾鶯			4	1	3	2				1	
灰頭鷓鴣	15	12	6		7	6		4	10	5	
褐頭鷓鴣	18	13	10	7	10	10	9	10	11	9	6
綠繡眼	6	19	14	6	15	7	19	17	14	7	5
黑臉鵪			2								
斑文鳥											
白喉文鳥			5								
麻雀	232	242	267	87	118	163	123	126	161	179	118
白尾八哥	6	4	7	11	8	6		2	7	6	12
家八哥	15	9	7	6	4	8	7	4	1	3	3
大卷尾	4	4	10	9	8	9	5	3	6	3	2
56 種	25 種	31 種	34 種	21 種	26 種	20 種	21 種	20 種	20 種	17 種	22 種
	866 隻次	836 隻次	893 隻次	343 隻次	493 隻次	488 隻次	412 隻次	446 隻次	493 隻次	449 隻次	483 隻次
歧異度	0.94	0.97	1.00	0.85	1.00	0.84	0.93	0.81	0.82	0.74	0.92
優勢度	0.16	0.17	0.18	0.24	0.17	0.24	0.19	0.26	0.24	0.28	0.18
均勻度	0.67	0.65	0.65	0.64	0.71	0.64	0.70	0.62	0.63	0.60	0.69
豐富度	8.17	10.27	11.18	7.90	9.28	7.07	7.65	7.17	7.06	6.03	7.82

表2-1.10、施工中第8季一般鳥類調查結果(3/6)

中文名	樣線 2										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
小鷺鷥	2		2								
蒼鷺			7								
小白鷺	4	17	8	3	5	4					
黃頭鷺	19	128	10	32	53	68	24	51	24	31	62
夜鷺		4	1								
埃及聖鸛						2					
黑翅鳶	2	5			1			1			
紅隼			1	1			1				
棕三趾鶉					1						
白腹秧雞	1	1	2	1		1	1		2		
紅冠水雞			1		1					1	2
緋秧雞		1								2	
彩鵲		1			4						
高蹺鴿		6	1			6					
燕鴿		18	2				3				
太平洋金斑鴿	24										
小環頸鴿		3	15								
小辮鴿				5							
田鴿									1		
鷹斑鴿		3			17				80		
珠頸斑鳩					8	4	1	2	4	3	4
紅鳩	137	436	224	89	121	161	133	164	148	197	143
番鴿	1	5								2	
小雨燕											7
小雲雀				3	6			8			
家燕	77	295	158	24	58	90	10	5	15	6	
洋燕			6	38	7	5	22	16	13	12	11
赤喉鸚			7	5							
西方黃鸚鵡	26		31	2	3		61	9			10
白頭翁	65	86	34	22	29	25	23	32	26	16	13
紅尾伯勞		5	7	1				2			4
棕背伯勞	1	7	6	4	5	3	2	3	5	3	1
黃尾鴿				1							
斑點鸛			2					2			
白腹鸛								1			
黃頭扇尾鶯	2				1				2	2	
棕扇尾鶯	3	1	4		5	5			7	3	
灰頭鷓鴣	6	16	2	1	9	8	1	5	9	5	
褐頭鷓鴣	11	17	14	7	9	12	10	12	10	9	4
綠繡眼	1	7	3	6		14	17	15	5	4	4
斑文鳥							8			8	
白喉文鳥		7									
麻雀	163	339	249	84	110	171	128	110	164	177	170
白尾八哥	2			4	6	3			3	4	10
家八哥	7	4	5	4	5	2	6	6		3	2
大卷尾	7	9	6	6	5	5	3	7	4	4	1
46 種	21 種	25 種	27 種	22 種	23 種	19 種	18 種	19 種	18 種	20 種	16 種
	561 隻次	1421 隻次	808 隻次	343 隻次	469 隻次	589 隻次	454 隻次	451 隻次	522 隻次	492 隻次	448 隻次
歧異度	0.89	0.83	0.85	0.96	0.98	0.85	0.87	0.86	0.84	0.73	0.73
優勢度	0.18	0.21	0.21	0.16	0.16	0.20	0.19	0.21	0.21	0.30	0.27
均勻度	0.67	0.59	0.59	0.72	0.72	0.66	0.69	0.67	0.67	0.56	0.61
豐富度	7.28	7.61	8.94	8.28	8.24	6.50	6.40	6.78	6.26	7.06	5.66

表2-1.10、施工中第8季一般鳥類調查結果(4/6)

中文名	樣線 3										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
小鷺鷥	1										
小白鷺	8	5	5			4		1		1	6
黃頭鷺	13	42	57	8		20	18	132	27	37	34
黑翅鳶			1					1			
紅隼			1	1			1				
棕三趾鶉						3					
白腹秧雞	2	4	1		1	5					
紅冠水雞	1	1			3	2			1		
彩鶉	2										
高蹺鴿					2						21
燕鴿		6			3						
太平洋金斑鴿											12
小環頸鴿			2								17
小辮鴿							4	25			
黑腹濱鶉											45
田鶉											2
鷹斑鶉		3							11		
青足鶉											5
小青足鶉											12
珠頸斑鳩				5		1	7	9	6	3	4
紅鳩	91	318	205	59	98	145	125	192	145	198	113
野鴿								8	9	6	
番鴿	1	1			3	1				2	
小雲雀				5	3			4	1		2
家燕	51	58	64	4	36	8	8	8	15	5	9
洋燕			4	13		6	13	25	3	6	21
赤喉鷓				7					5		
西方黃鶉鴿			12	1	2	5	43	18			9
白頭翁	48	38	24	22	32	33	27	24	27	14	16
紅尾伯勞		10	6	1		1	1		1	2	4
棕背伯勞	7	9	5	4	7	3	2	3	4	3	2
黃尾鴿							1				
斑點鶉							3	4			
遠東樹鶯	1										
黃頭扇尾鶯	1				2				2		
棕扇尾鶯	3	2			6	7			7		
灰頭鷓鶯	6	5	2		11	7		5	13	5	
褐頭鷓鶯	12	13	9	9	11	13	5	11	9	11	6
綠繡眼				4		5	8		5	5	
黑臉鷓			1								
斑文鳥					6	9	8				5
白喉文鳥		7									
麻雀	164	287	245	59	101	144	132	86	137	177	490
白尾八哥			2	6	4	2		4	7		3
家八哥	2	3	1	2	8	6	5	4	5	6	6
大卷尾	2	6	3	5	9	4	1	3	4	2	2
46 種	19 種	19 種	20 種	18 種	20 種	23 種	19 種	20 種	22 種	17 種	24 種
	416 隻次	818 隻次	650 隻次	215 隻次	348 隻次	434 隻次	412 隻次	567 隻次	444 隻次	483 隻次	846 隻次
歧異度	0.80	0.72	0.74	0.95	0.92	0.86	0.85	0.88	0.90	0.68	0.75
優勢度	0.23	0.28	0.26	0.17	0.19	0.23	0.21	0.20	0.21	0.31	0.36
均勻度	0.62	0.56	0.57	0.76	0.70	0.63	0.66	0.68	0.67	0.55	0.54
豐富度	6.87	6.18	6.75	7.29	7.48	8.34	6.88	6.90	7.93	5.96	7.86

表2-1.10、施工中第8季一般鳥類調查結果(5/6)

中文名	樣線 4										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
蒼鷺				1							
小白鷺	5	4	1								5
黃頭鷺	2	17	14	8	11	96	21		15	20	59
栗小鷺									1		
棕三趾鶉	1										
白腹秧雞	1	1									
紅冠水雞										1	
高蹺鴿		8			6						85
燕鴿		8				2			4	2	7
太平洋金斑鴿						1					
東方環頸鴿		29									
小環頸鴿		5				28				27	3
田鴿											2
反嘴鴿											4
珠頸斑鳩						1		2		1	
紅鳩	81	224	92	56	71	65	63	78	93	97	76
野鴿		7								13	8
番鴿					1						
台灣夜鷹	1										
小雲雀				1				1			
家燕	21	25	13	4	23	44	6		23	15	5
洋燕				13		3	6	18	8	15	17
西方黃鶺鴒	2		5		5	3	11	5			4
白頭翁	48	28	24	17	18	13	7	16	17	9	12
紅尾伯勞		5	3	1			1	1		1	3
棕背伯勞	1	3	1		2						
黃頭扇尾鶯		2							2	1	
棕扇尾鶯						2			4	3	
灰頭鷓鴣	4	5	1		4	1		2	5	2	1
褐頭鷓鴣	8	6	7	7	7	6	5	5	9	2	6
綠繡眼		3									
麻雀	117	159	140	98	99	64	93	97	102	123	115
白尾八哥			3	6	1	9	3	2	2	2	17
家八哥		2		2	5	14	7	6	3		6
大卷尾	3	2	2	3	4	1	1		3	1	1
35 種	14 種	20 種	13 種	13 種	14 種	17 種	12 種	12 種	15 種	18 種	20 種
	295 隻次	543 隻次	306 隻次	217 隻次	257 隻次	353 隻次	224 隻次	233 隻次	291 隻次	335 隻次	436 隻次
歧異度	0.70	0.79	0.66	0.72	0.79	0.89	0.74	0.67	0.79	0.80	0.94
優勢度	0.27	0.27	0.31	0.28	0.24	0.17	0.27	0.30	0.24	0.24	0.16
均勻度	0.61	0.60	0.60	0.65	0.69	0.73	0.68	0.62	0.67	0.64	0.72
豐富度	5.26	6.95	4.83	5.14	5.39	6.28	4.68	4.65	5.68	6.73	7.20

表2-1.10、施工中第8季一般鳥類調查結果(6/6)

中文名	樣線 5										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
大白鷺			2								
中白鷺	1		3	1							
小白鷺	6	13	24	21	2	15	16	12	5	4	16
黃頭鷺	33	243	51	56	88	107	13	44	51	218	93
夜鷺					2	1	2	1	1		1
栗小鷺										1	
埃及聖鷺		1	1	11		2		2	2		
黑翅鷺		2								1	
紅隼			1				1	1			
紅冠水雞					1	2					
彩鷓			15							4	
高蹺鴿	1	22	22		9	29	4			15	105
燕鴿										17	10
東方環頸鴿		25									
小環頸鴿		28	195				15				53
小辮鴿							3				2
黑腹濱鴿											50
長趾濱鴿											15
田鴿											6
黃足鴿		2									
鷹斑鴿	1	11	32	29	55	5		36	17	7	64
磯鴿		7									
青足鴿											15
小青足鴿											25
白翅黑燕鷗									6		
小燕鷗		1			3				1		
珠頸斑鳩			3	3	6	7	6		2	2	3
紅鳩	73	323	66	69	88	119	88	81	106	173	180
野鳩		5				5		3		7	5
小雨燕										5	
翠鳥	2				1		2		1		2
小雲雀				2	3			2	2		4
家燕	51	30	10		44	14			5	36	23
洋燕				11			16	3	13		48
赤喉鸚			2					11			
白鶺鴒		1									
西方黃鶺鴒			23	3		5	51	21		2	12
白頭翁	34	22	17	4	19	22	17	31	21	18	15
紅尾伯勞		7	2	3	2	1	4	3	1	1	6
棕背伯勞	2	2	3	2	1	1	2			1	1
鶺鴒											1
棕扇尾鶺鴒					9	7			9	9	
灰頭鶺鴒	6	4			5	6			9	5	1
褐頭鶺鴒	11	5	13	7	14	11	7	14	13	6	9
黑臉鶺鴒									1		
斑文鳥			12				7			13	20
白喉文鳥		6	6								
麻雀	103	316	110	80	129	157	183	145	163	273	290
白尾八哥	1		3	7	2	18		5	2	4	13
家八哥		5	1		4	12	6		7	6	3
大卷尾	3	2	5	8	4	4	2	3	4	1	5
51 種	15 種	24 種	25 種	17 種	22 種	22 種	20 種	18 種	23 種	25 種	32 種
	328 隻次	1083 隻次	622 隻次	317 隻次	491 隻次	550 隻次	445 隻次	418 隻次	442 隻次	829 隻次	1096 隻次
歧異度	0.82	0.80	1.01	0.93	0.94	0.94	0.86	0.90	0.88	0.82	1.10
優勢度	0.20	0.23	0.16	0.16	0.16	0.17	0.23	0.19	0.21	0.23	0.13
均勻度	0.70	0.58	0.72	0.76	0.70	0.70	0.66	0.71	0.65	0.59	0.73
豐富度	5.56	7.58	8.59	6.40	7.80	7.66	7.17	6.49	8.32	8.22	10.20

表2-1.11、施工中第8季水鳥調查結果(1/5)

中文名	水 1											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
小鷺鶒	2				4	1						
蒼鷺			7	7			1	5			10	
大白鷺	1		8	10	2		2	25			1	
中白鷺				5			2					
小白鷺	30	28	39	27	94	34	25	44	60	43	50	
黃頭鷺	6		14				2	2	2	1		
夜鷺	2	5	7	4	5	2	4	3	7	5		
赤頸鴨				10								
紅冠水雞	1	2	1	2	1		1					
高蹺鴣	7	7		19		38		25	18	2	5	
東方環頸鴣					10	101	25		5			
小環頸鴣						3						
鐵嘴鴣						21						
翻石鴣						38						
黑腹濱鴣						30		60				
紅胸濱鴣						52						
長趾濱鴣						9						
鷹斑鴣						12						
磯鴣						1		1				
青足鴣								7				
小青足鴣						12		10				
赤足鴣						11						
小燕鷗	1	3			2				10	5		
紅鳩	22	72	64	18	22	20	12	8	22	36	9	
珠頸斑鳩						2			3			
翠鳥										1		
小雲雀	1				2							
家燕	26	7			10	19		5		7		
赤腰燕	4											
洋燕	4	3	2	11	7	5		5	20	11	22	
棕沙燕									3			
西方黃鸝							3					
白頭翁	13	8	15	6	5	3		6	13	7	4	
紅尾伯勞							1				1	
棕背伯勞		3	2							1	1	
灰頭鷓鴣	1				2			1	2	2		
褐頭鷓鴣	3		1			2		5	6	4	4	
麻雀	102	127	95	30	38	39	27	53	59	56	49	
家八哥	8	3				3	4	4	1	8	3	
大卷尾						2				2		
40 種	18 種	12 種	12 種	12 種	14 種	24 種	13 種	18 種	15 種	16 種	12 種	
	234 隻次	268 隻次	255 隻次	149 隻次	204 隻次	460 隻次	109 隻次	269 隻次	231 隻次	191 隻次	159 隻次	
歧異度	0.85	0.67	0.76	0.98	0.78	1.13	0.85	0.99	0.93	0.89	0.78	
優勢度	0.23	0.31	0.23	0.12	0.27	0.10	0.18	0.14	0.16	0.18	0.22	
均勻度	0.68	0.62	0.71	0.90	0.68	0.82	0.76	0.79	0.79	0.74	0.72	
豐富度	7.18	4.53	4.57	5.06	5.63	8.64	5.89	7.00	5.92	6.58	5.00	

表2-1.11、施工中第8季水鳥調查結果(2/5)

中文名	水 2										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
蒼鷺			10								
大白鷺			28	3			3	8			2
小白鷺	47	42	116	22	84	21	25	23	80	18	22
黃頭鷺	1			3					3		
夜鷺	5	4	6	5	2	5			7	3	
紅冠水雞		2							3		
高蹺鴿	4			5	3		17		8		10
東方環頸鴿		50			15		21				
小環頸鴿											2
鐵嘴鴿		17			5						
鷹斑鷓							5				
磯鷓							1	1		1	3
小青足鷓							6				
小燕鷗		2			1	3			1		
銀鷗				1							
紅鳩	7	41	23		15	18	4	10	5	18	10
珠頸斑鳩							2				
家燕	3	44				3		2			
洋燕	2		9	5		9	6			7	
白頭翁	8	7	5	5	7	4		6	13	4	5
紅尾伯勞								1	1		
棕背伯勞	2										
藍磯鶇											1
褐頭鷓鴣		2					1	5	2	1	
麻雀	53	98	60	21	22	22	11	22	37	16	19
家八哥				6	4	4	2	3		2	2
26 種	10 種	11 種	8 種	10 種	10 種	9 種	13 種	10 種	11 種	9 種	10 種
	132 隻次	309 隻次	257 隻次	76 隻次	158 隻次	89 隻次	104 隻次	81 隻次	160 隻次	70 隻次	76 隻次
歧異度	0.67	0.81	0.68	0.84	0.68	0.83	0.93	0.82	0.67	0.77	0.82
優勢度	0.30	0.19	0.28	0.19	0.32	0.18	0.15	0.19	0.32	0.20	0.19
均勻度	0.67	0.78	0.75	0.84	0.68	0.87	0.84	0.82	0.65	0.81	0.82
豐富度	4.24	4.02	2.90	4.79	4.09	4.10	5.95	4.72	4.54	4.32	4.79

表2-1.11、施工中第8季水鳥調查結果(3/5)

中文名	水 3										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
小鷺鷥					1						
蒼鷺			36	13			1	78		1	31
大白鷺			15	9	4		6	41	1		3
中白鷺							2			6	
小白鷺	79	108	47	7	47	50	99	59	39	97	86
黃頭鷺	10	1									2
夜鷺	2	8	5	2	4	8	2		3	1	2
赤頭鴨				14				45			
小水鴨				4							
紅冠水雞	1	2	2		1				1	1	
高蹺鴿	8	12	2	7	6	5	38		5	10	16
東方環頸鴿	2	173	49	86	42	292	604	734	392	240	750
鐵嘴鴿					27	59	45	48	130	25	20
蒙古鴿					7			3	5		
太平洋金斑鴿			63			6				7	4
灰斑鴿			29	61	5	4	179	265			75
翻石鷗			21	7		43	51	231	75	35	145
黑腹濱鷗					12		137	840	550		110
彎嘴濱鷗						3		7	15		
紅胸濱鷗					100		36	50	140		
大濱鷗						7	15		40		
三趾濱鷗								20			
斑尾鷗			6								
中杓鷗						2					
黃足鷗									15	5	
鷹斑鷗		8									
磯鷗			2							2	2
青足鷗					8			2			5
小青足鷗						6	17	2		16	30
赤足鷗							5				
反嘴鷗				1		2	3	5	3		
小燕鷗	8	8			9	5			15	20	
銀鷗							30	2			
紅鳩	15	58	37	5	15	35		23	22	40	7
珠頸斑鳩						4			3		
翠鳥	1							1			
小雲雀	2										
家燕						110					
洋燕	6	5	5			10	6	3	8	11	5
棕沙燕						3		3	5		15
西方黃鸝			3	1			8				
白頭翁	10	8		6	8	3			5		3
紅尾伯勞									1		
棕背伯勞	2	2						1			
褐頭鷓鴣	2	2						8	2	1	2
麻雀	56	98	71	12	33	46	12	43	27	33	23
家八哥					2			2		2	
47 種	15 種	14 種	16 種	15 種	18 種	21 種	20 種	25 種	24 種	19 種	21 種
	204 隻次	493 隻次	393 隻次	235 隻次	331 隻次	703 隻次	1296 隻次	2516 隻次	1502 隻次	553 隻次	1336 隻次
歧異度	0.80	0.76	1.01	0.86	0.98	0.88	0.82	0.83	0.84	0.85	0.73
優勢度	0.24	0.23	0.12	0.22	0.15	0.22	0.26	0.22	0.22	0.24	0.34
均勻度	0.68	0.67	0.84	0.73	0.78	0.66	0.63	0.60	0.61	0.66	0.55
豐富度	6.06	4.83	5.78	5.90	6.75	7.03	6.10	7.06	7.24	6.56	6.40

表2-1.11、施工中第8季水鳥調查結果(4/5)

中文名	水 4											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
小鷺鷥					10	3	6	9	1	2	2	
蒼鷺							1				4	
大白鷺			1	2			4	1			5	
小白鷺	62	128	61	21	20	47	62	57	16	127	153	
夜鷺		2		4	3	2			4		1	
紅冠水雞			1		1		3	1	2			
高蹺鴣	4	5			9	35	5	3	3	20	5	
東方環頸鴣	55	1057	1655	421	483	435	1377	805	520	610	1400	
小環頸鴣		23										
鐵嘴鴣	7	112	42	38	103	92	84	55	170	90	110	
蒙古鴣		23		9	25	26	23	8	15	15	15	
太平洋金斑鴣				16		8				18	5	
灰斑鴣				22	46	3	34	20	10		55	
翻石鴣	38	120	227	55	140	114	289	135	245	210	155	
黑腹濱鴣	80	74	146	251	251	79	424	1230	380		558	
紅腹濱鴣					17				25			
彎嘴濱鴣			9	21	38	29	15	10	35		10	
紅胸濱鴣	120		156	12	210	138	187	240	120		140	
大濱鴣					17	7			45			
三趾濱鴣			48	4	15	11	62	90	25	30	90	
大杓鴣											8	
中杓鴣	6					7				56	10	
黃足鴣		133			66	144			182	160		
鷹斑鴣		64						2				
磯鴣		55	24	6	5		5	7	3		7	
青足鴣	9											
小青足鴣						8	7					
赤足鴣						6	6					
反嘴鴣							5	2		15	25	
紅領瓣足鴣							1					
白翅黑燕鷗				3								
小燕鷗	8	13			35	18			55	46		
銀鷗				5			2	1	2			
紅鳩	13				32	30	6		7	75	4	
家燕					10							
洋燕		1			1	4	5	7	3	5	10	
西方黃鶺鴒						3	11					
白頭翁									2			
麻雀		10					9	16	16	27	51	
39 種	11 種	15 種	11 種	16 種	23 種	23 種	25 種	20 種	24 種	16 種	23 種	
	402 隻次	1820 隻次	2370 隻次	887 隻次	1540 隻次	1249 隻次	2633 隻次	2699 隻次	1886 隻次	1506 隻次	2823 隻次	
歧異度	0.83	0.69	0.50	0.69	0.97	0.98	0.72	0.67	0.95	0.87	0.76	
優勢度	0.18	0.36	0.51	0.31	0.16	0.17	0.32	0.31	0.16	0.21	0.30	
均勻度	0.80	0.59	0.48	0.57	0.72	0.72	0.51	0.51	0.69	0.73	0.56	
豐富度	3.84	4.29	2.96	5.09	6.90	7.10	7.02	5.54	7.02	4.72	6.38	

表2-1.11、施工中第8季水鳥調查結果(5/5)

中文名	水 5											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
小鷺鶯							1					
蒼鷺											10	
大白鷺			1		1		2	3			5	
中白鷺						5						
小白鷺	77	51	37	25	37	108	31	32	105	31	50	
黃頭鷺		4			11	30			3	3	5	
夜鷺	2	3		4		1			3		1	
高蹺鴿	5	42				7			4	12	3	
東方環頸鴿	54	201	189	321	48	150	286	301	75	130	200	
鐵嘴鴿	20	13	12	43	27	32	32	25	14	20	15	
蒙古鴿				22	4			2		2		
灰斑鴿				4		2		3				
翻石鴿	60	49	13	35	43	69	40	35	32	130	35	
黑腹濱鴿	130	33	12	255	63	15	32	124			65	
彎嘴濱鴿	12		8	5	10							
紅胸濱鴿	185			37	14	24						
三趾濱鴿				9								
大杓鴿											5	
中杓鴿	23					2				5		
黃足鴿	12	13	14			3			10	55		
鷹斑鴿		24		6								
磯鴿		14	17	2		3		3			3	
青足鴿	9											
小青足鴿						2		2			10	
反嘴鴿										10		
小燕鷗	12	4			5	14			40	155		
燕鷗										2		
銀鷗				5								
紅鳩	17	1	4		47	30	3		24	83	9	
小雲雀				2					2			
家燕			6		12			3				
洋燕		1		7	3	7	6	14		5	20	
赤喉鸚								3				
大花鸚											6	
西方黃鸚鵡				1			2	3	2		5	
白頭翁					6				2			
紅尾伯勞					1					1		
褐頭鷓鴣									5	3		
麻雀		5		12	31	3	11	12	20	56	12	
39 種	14 種	15 種	11 種	19 種	17 種	19 種	11 種	15 種	15 種	17 種	18 種	
	618 隻次	458 隻次	313 隻次	795 隻次	363 隻次	507 隻次	446 隻次	565 隻次	341 隻次	703 隻次	459 隻次	
歧異度	0.90	0.83	0.64	0.75	1.05	0.93	0.57	0.66	0.89	0.93	0.87	
優勢度	0.17	0.24	0.39	0.28	0.11	0.17	0.44	0.34	0.18	0.15	0.23	
均勻度	0.78	0.70	0.62	0.59	0.85	0.73	0.55	0.56	0.76	0.76	0.69	
豐富度	4.66	5.26	4.01	6.21	6.25	6.65	3.77	5.09	5.53	5.62	6.39	

表2-1.12、本計畫與96年環評調查結果比較(1/3)

目名	科名	中文名	96年環評	本計畫
鷺鷥目	鷺鷥科	小鷺鷥	*	*
鸛形目	鷺科	大白鷺	*	*
		中白鷺	*	*
		小白鷺	*	*
		蒼鷺	*	*
		紫鷺	*	
		黃頭鷺	*	*
		夜鷺	*	*
		栗小鷺		*
		黃小鷺		*
		鵞科	埃及聖環	*
雁形目	雁鴨科	尖尾鴨	*	
		小水鴨	*	*
		赤頸鴨	*	*
		鳳頭潛鴨	*	
鷹形目	鷲鷹科	黑翅鷲	*	*
		東方澤鷲	*	
		北雀鷲	*	
		灰面鷲鷹	*	
	隼科	紅隼	*	*
		遊隼	*	
鶴形目	三趾鶉科	棕三趾鶉	*	*
	秧雞科	白腹秧雞	*	*
		紅冠水雞	*	*
		緋秧雞		*
		灰胸秧雞		*
鴿形目	彩鴿科	彩鴿	*	*
	長腳鴿科	高蹺鴿	*	*
	燕鴿科	燕鴿		*
	鴿科	東方環頸鴿	*	*
		小環頸鴿	*	*
		蒙古鴿	*	*
		鐵嘴鴿	*	*
		灰斑鴿	*	*
		太平洋金斑鴿	*	*
		小辮鴿	*	*
	鴿科	田鴿	*	*
		半蹠鴿	*	
		黑尾鴿	*	
		斑尾鴿	*	*
		駝鴿	*	
		反嘴鴿	*	*
磯鴿		*	*	
翻石鴿		*	*	
大濱鴿		*	*	

表2-1.12、本計畫與96年環評調查結果比較(2/3)

目名	科名	中文名	96年環評	本計畫		
鴿形目	鴿科	紅腹濱鴿	*	*		
		三趾濱鴿	*	*		
		黑腹濱鴿	*	*		
		彎嘴濱鴿	*	*		
		紅胸濱鴿	*	*		
		小濱鴿	*			
		長趾濱鴿	*	*		
		尖尾濱鴿	*	*		
		寬嘴鴿	*			
		紅領瓣足鴿	*	*		
		大杓鴿	*	*		
		中杓鴿	*	*		
		小杓鴿	*			
		鷹斑鴿	*	*		
		赤足鴿	*	*		
		黃足鴿	*	*		
		小青足鴿	*	*		
		青足鴿	*	*		
		鴿形目	鴿科	小黑背鴿	*	
				黑嘴鴿	*	
鴿嘴燕鴿	*					
黑腹燕鴿	*					
白翅黑燕鴿	*			*		
小燕鴿	*			*		
燕鴿				*		
銀鴿				*		
鴿形目	鳩鴿科	紅鳩	*	*		
		珠頸斑鳩	*	*		
		野鳩		*		
鴿形目	杜鵑科	中杜鵑	*			
		番鴿	*	*		
鴿形目	鴿鴿科	短耳鴿	*			
夜鷹目	夜鷹科	台灣夜鷹		*		
雨燕目	雨燕科	小雨燕	*	*		
佛法僧目	翠鳥科	翠鳥	*	*		
雀形目	百靈科	小雲雀	*	*		
	燕科	家燕	*	*		
		赤腰燕	*	*		
		洋燕	*	*		
		棕沙燕	*	*		
	鵲鴿科	西方黃鵲鴿	*	*		
		白鵲鴿	*	*		
		大花鵲	*	*		
		赤喉鵲	*	*		
	鶉科	白頭翁	*	*		

表2-1.12、本計畫與96年環評調查結果比較(3/3)

目名	科名	中文名	96年環評	本計畫	
雀形目	伯勞科	紅尾伯勞	*	*	
		棕背伯勞	*	*	
	鶇科	白腹鶇	*	*	
		紅尾鶇	*		
		藍磯鶇		*	
		斑點鶇	*	*	
	鶇科	鶇鶇		*	
		黃尾鶇	*	*	
		漠即	*		
	鶇科	粉紅鸚嘴	*		
	樹鶇科	短翅樹鶇	*	*	
	葦鶇科	東方大葦鶇	*		
	柳鶇科	極北柳鶇	*		
	扇尾鶇科	黃頭扇尾鶇		*	
		棕扇尾鶇	*	*	
		灰頭鶇鶇	*	*	
		褐頭鶇鶇	*	*	
	繡眼科	綠繡眼	*	*	
	鶇科	黑臉鶇	*	*	
	梅花雀科	斑文鳥	*	*	
		白喉文鳥	*	*	
	麻雀科	麻雀	*	*	
	八哥科	白尾八哥	*	*	
		家八哥	*	*	
	卷尾科	大卷尾	*	*	
	鴉科	喜鵲	*		
	合計				
	13 目	39 科	116 種	104 種	91 種

註：本計畫調查期間至今共11季次。




圖2-1.3、陸域鳥類歷季調查種類及數量




圖2-1.4、水鳥歷季調查種類及數量

三、哺乳類

1.種屬組成

本季調查共記錄哺乳類2目2科3種83隻次，包括蝙蝠科的東亞家蝠；鼠科的鬼鼠、小黃腹鼠(表2-1.14)。

2.特化性物種

本季調查未發現特有種哺乳類。

3.保育等級

本季調查並無發現任何保育類野生動物。

4.優勢種群

本季哺乳類調查結果中，數量最多的物種為東亞家蝠(76隻次)，佔出現數量的91.6%。東亞家蝠為平原、農地、住宅區常見之小型蝙蝠，適應力高，可於高度開發的都會區附近活動。

5.與上季資料比較

本季監測記錄哺乳類2目2科3種83隻次，上一季監測記錄2目2科3種273隻次；兩季共同出現物種有3種，相似度為100.0%。

6.與歷年同季資料比較

98年第4季監測記錄4種136隻次，99年第4季監測記錄3種118隻次，本季記錄3種83隻次。各年間同季比較，發現種類與數量皆以98年第4季為最多，歷年同季中共同出現的物種有3種，分別為東亞家蝠、鬼鼠與小黃腹鼠。由於多數哺乳類動物生性較為隱蔽，且容易受到天候、人為干擾等因素影響，造成各年間的調查結果有所差異。

7.各樣線哺乳類調查概況如下：

[陸域樣線1]

本季哺乳類調查結果，共記錄東亞家蝠與小黃腹鼠2種16隻次。東亞家蝠白天喜愛躲藏在房屋、廢棄建築等較陰暗環境，於天黑後開始活動，常出現在路燈底下覓食昆蟲。小黃腹鼠廣泛分布於中、低海拔的農墾地、草生地等地區，主要以農作物、雜草為食。

[陸域樣線2]

本季哺乳類調查結果，共記錄東亞家蝠與小黃腹鼠2種16隻次。所記錄之東亞家蝠於天黑後在空中活動、覓食。

[陸域樣線3]

本季哺乳類調查結果，共記錄東亞家蝠、鬼鼠與小黃腹鼠3種19隻次，數量較多者為東亞家蝠，佔本樣線調查比例為89.5%。鬼鼠為台灣鼠科中體型最大者，性情凶猛，受干擾時會發出「嘶、嘶」的威嚇聲，為平地之農耕地、廢耕地等環境常見的老鼠。

[陸域樣線4]

本季哺乳類調查結果，僅記錄東亞家蝠1種13隻次，所記錄之東亞家蝠於天黑後在空中活動、覓食。

[陸域樣線5]

本季哺乳類調查僅記錄東亞家蝠與鬼鼠2種19隻次，所記錄之東亞家蝠於天黑後在空中活動、覓食。

8.與施工前階段資料比較

施工前監測階段共進行3季次的調查，調查時間為98年4~12月，結果共記錄哺乳類目2科4種。施工中監測自99年1月起，至本季共進行8季次調查，發現哺乳類計有3科4種。目前為止，兩階段共同發現的物種計有3種，物種相似度為60.0%。僅在施工前監測階段記錄的種類為田鼯鼠1種；而施工中監測階段新增台灣鼯鼠1種。

9.與96年環境影響說明書調查結果比較

96年環評調查結果，共記錄哺乳類4科10種，本計畫目前執行11季的調查，總計共發現哺乳類3科5種(表2-1.15)。其中，僅在96年調查有發現的哺乳類為小麝鼯、臭鼯、棕蝠、摺翅蝠、溝鼠等5種，而本計畫並無新增物種。97年環評調查記錄較多種哺乳類，調查樣線範圍的不同是造成此差異的主要原因。

表2-1.13、陸域生態哺乳類調查名錄

目名	科名	中文名	學名	特化性	保育等級
鼯形目	鼯鼠科	台灣鼯鼠	<i>Mogera insularis insularis</i>	Es	
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>		
齧齒目	鼠科	鬼鼠	<i>Bandicota indica</i>		
		田鼯鼠	<i>Mus caroli</i>		
		小黃腹鼠	<i>Rattus losea</i>		
合計					
3 目	3 科	5 種		1 種	

註：特化性一欄「Es」指台灣特有亞種。

表2-1.14、施工中第8季哺乳類調查結果(1/5)

中文名	樣線 1										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
台灣鼯鼠				1	1	2		1			
東亞家蝠	67	166	26	8	23	91	23	10	35	48	14
鬼鼠		2			1	1	2				
田鼯鼠			1								
小黃腹鼠		3	2	2		1	2	1		3	2
5 種	1 種	3 種	3 種	3 種	3 種	4 種	3 種	3 種	1 種	2 種	2 種
	67 隻次	171 隻次	29 隻次	11 隻次	25 隻次	95 隻次	27 隻次	12 隻次	35 隻次	51 隻次	16 隻次
歧異度	0.00	0.07	0.17	0.33	0.15	0.09	0.23	0.25	0.00	0.10	0.16
優勢度	1.00	0.94	0.81	0.57	0.85	0.92	0.74	0.71	1.00	0.89	0.78
均勻度	-	0.14	0.36	0.69	0.30	0.16	0.48	0.52	-	0.32	0.54
豐富度	0.00	0.90	1.37	1.92	1.43	1.52	1.40	1.85	0.00	0.59	0.83

表2-1.14、施工中第8季哺乳類調查結果(2/5)

中文名	樣線 2										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
東亞家蝠	61	156	20	4	16	96	19	8	29	54	15
鬼鼠	1		1	1	1	2	1	1	2	2	
小黃腹鼠				1	1	1			1		1
3 種	2 種	1 種	2 種	3 種	3 種	3 種	2 種	2 種	3 種	2 種	2 種
	62 隻次	156 隻次	21 隻次	6 隻次	18 隻次	99 隻次	20 隻次	9 隻次	32 隻次	56 隻次	16 隻次
歧異度	0.04	0.00	0.08	0.38	0.18	0.07	0.09	0.15	0.16	0.07	0.10
優勢度	0.97	1.00	0.91	0.50	0.80	0.94	0.91	0.80	0.83	0.93	0.88
均勻度	0.12	-	0.28	0.79	0.39	0.14	0.29	0.50	0.34	0.22	0.34
豐富度	0.56	0.00	0.76	2.57	1.59	1.00	0.77	1.05	1.33	0.57	0.83

表2-1.14、施工中第8季哺乳類調查結果(3/5)

中文名	樣線 3										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
東亞家蝠	48	145	30	6	20	76	25	7	35	55	17
鬼鼠	1		2	1	1	1	1	1	2	3	1
小黃腹鼠				1		2	1	1	1		1
3種	2種	1種	2種	3種	2種	3種	3種	3種	3種	2種	3種
	49隻次	145隻次	32隻次	8隻次	21隻次	79隻次	27隻次	9隻次	38隻次	58隻次	19隻次
歧異度	0.04	0.00	0.10	0.32	0.08	0.08	0.14	0.30	0.14	0.09	0.18
優勢度	0.96	1.00	0.88	0.59	0.91	0.93	0.86	0.63	0.85	0.90	0.81
均勻度	0.14	-	0.34	0.67	0.28	0.17	0.29	0.62	0.30	0.29	0.37
豐富度	0.59	0.00	0.66	2.21	0.76	1.05	1.40	2.10	1.27	0.57	1.56

表2-1.14、施工中第8季哺乳類調查結果(4/5)

中文名	樣線 4										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
東亞家蝠	43	98	28	10	23	59	18	7	21	54	13
小黃腹鼠					1						
2種	1種	1種	1種	1種	2種	1種	1種	1種	1種	1種	1種
	43隻次	98隻次	28隻次	10隻次	24隻次	59隻次	18隻次	7隻次	21隻次	54隻次	13隻次
歧異度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
優勢度	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
均勻度	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-
豐富度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2-1.14、施工中第8季哺乳類調查結果(5/5)

中文名	樣線 5										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
東亞家蝠	43	94	26	9	25	79	25	8	31	54	17
鬼鼠					2	1	1		1		2
小黃腹鼠								1	2		
3 種	1 種	1 種	1 種	1 種	2 種	2 種	2 種	2 種	3 種	1 種	2 種
	43 隻次	94 隻次	26 隻次	9 隻次	27 隻次	80 隻次	26 隻次	9 隻次	34 隻次	54 隻次	19 隻次
歧異度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.03	0.07	0.15	0.15	0.00	0.15
優勢度	1.00	1.00	1.00	1.00	0.86	0.98	0.93	0.80	0.84	1.00	0.81
均勻度	-	-	-	-	0.38	0.10	0.24	0.50	0.32	-	0.49
豐富度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.53	0.71	1.05	1.31	0.00	0.78

表2-1.15、本計畫與96年環評調查結果比較

目名	科名	中文名	學名	特化性	保育等級	96年環評	本計畫
齧形目	尖鼠科	小麝鼯	<i>Crocidura suaveolens hosletti</i>	Es		*	
		臭鼯	<i>Suncus murinus</i>			*	
	鼯鼠科	台灣鼯鼠	<i>Mogera insularis insularis</i>	Es		*	*
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>			*	*
		棕蝠	<i>Eptesicus serotinus horikawai</i>	Es		*	
		摺翅蝠	<i>Miniopterus schreibersii fuliginosus</i>			*	
齧齒目	鼠科	兔鼠	<i>Bandicota indica</i>			*	*
		田鼠	<i>Mus caroli</i>			*	*
		小黃腹鼠	<i>Rattus losea</i>			*	*
		溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>			*	
合計							
3 目	4 科	10 種		3 種		10 種	5 種

註1：特化性一欄「Es」指台灣特有亞種。

2：本計畫調查期間至今共11季次。




圖2-1.5、歷季哺乳類調查種類及數量

四、兩棲爬蟲類

1.種屬組成

本季調查共記錄兩棲爬蟲類3目5科6種153隻次，發現物種為平地常見的種類，包括狹口蛙科的小雨蛙；叉舌蛙科的澤蛙；河龜科的斑龜；壁虎科的無疣蝎虎、蝎虎；蝙蝠蛇科的眼鏡蛇(表2-1.17)。

2.特化性物種

本季調查未發現任何特化性物種。

3.保育等級

本季調查發現眼鏡蛇1種其他應予保育之保育類動物，保育類物種佔出現種類的16.7%。

4.優勢種群

本季兩棲爬蟲類調查結果中，數量最多的物種為蝎虎(105隻次)，佔本季出現數量的68.6%。蝎虎為平原、農地、住宅區常見之爬蟲類，適應力高，可於高度開發的都會區附近活動，為平地常見之小型爬蟲類。

5.與上季資料比較

本季監測記錄兩棲爬蟲類3目5科6種153隻次，上一季監測記錄2目7科8種164隻次；兩季共同出現物種有5種，相似度為55.6%。僅在上季有發現之物種為貢德氏赤蛙、中國石龍子台灣亞種與草花蛇3種，而本季新增眼鏡蛇1種。

6.與歷年同季資料比較

98年第4季監測記錄6種154隻次，99年第4季監測記錄7種131隻次，本季記錄6種153隻次。發現物種以99年第4季最多，而數量則以98年第4季最多。就發現物種而言，歷年同季共同出現的物種有2種，分別為無疣蝎虎與蝎虎。由於兩棲爬蟲類的活動容易受環境以及天候狀況影響，如氣溫、降雨等，因此不同年間所記錄的種類、數量會有所差異。

7.各樣線兩棲爬蟲類調查概況如下：

[陸域樣線1]

本季兩棲爬蟲類調查結果，共記錄小雨蛙與蝎虎2種35隻次。本季調查並未發現任何保育類物種。數量最多的物種為蝎虎(23隻次)，佔出現數量的65.7%。

[陸域樣線2]

本季兩棲爬蟲類調查結果，共記錄小雨蛙、澤蛙與蝎虎等3種24隻次。數量較多的物種為蝎虎(17隻次)，佔出現數量的70.8%。

[陸域樣線3]

本季兩棲爬蟲類調查結果，共記錄小雨蛙、蝎虎與眼鏡蛇等3種27隻次。本季調查發現眼鏡蛇1種保育類物種，佔發現物種比例為33.3%。數量較多的物種為蝎虎(20隻次)，佔出現數量的74.1%。

[陸域樣線4]

本季兩棲爬蟲類調查結果，共記錄小雨蛙、無疣蝎虎與蝎虎等3種28隻次。數量較多的物種為蝎虎(23隻次)，佔出現數量的82.1%。

[陸域樣線5]

本季兩棲爬蟲類調查結果，共記錄小雨蛙、澤蛙、斑龜與蝎虎等4種39隻次。數

量較多的物種為蝎虎(22隻次)，佔出現數量的56.4%。

8.與施工前階段資料比較

施工前監測階段共進行3季次的調查，調查時間為98年4~12月，結果共記錄兩棲爬蟲類2目7科13種。施工中監測階段自99年1月起，至本季共進行8季次調查，發現兩棲爬蟲類計有3目10科14種。目前為止，兩階段共同發現的物種計有11種，物種相似度為68.8%。僅在施工前監測階段記錄的種類有花浪蛇及雨傘節2種；而施工中監測階段新增斑龜、台灣中國石龍子與蓬萊草蜥3種。由於爬蟲類較無固定的行進路線，因此除少數種類外，大部份目擊發現的個體數量均較低，而蛇類則容易受到逢機目擊機率的影響而有所不同，造成在記錄物種數上會有所差異。

9.與96年環境影響說明書調查結果比較

96年環評調查結果，共記錄兩棲爬蟲類7科8種，本計畫目前共執行11季的調查，總計共發現兩棲爬蟲類10科16種(表2-1.18)。其中，96年調查記錄的兩棲爬蟲類均有在本計畫調查中發現，而本計畫調查新增斑龜、無疣蝎虎、花浪蛇、臭青公、赤背松柏根、南蛇、草花蛇及雨傘節等8種。兩棲爬蟲類中，蛇類因為活動路線較不固定，且範圍較大，常受到逢機目擊的機率所影響，因此差異較大。

表2-1.16、陸域生態兩棲爬蟲類調查名錄

目名	科名	中文名	學名	特化性	保育等級
無尾目	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>		
	狹口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>		
	赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>		
	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>		
龜鱉目	河龜科	斑龜	<i>Ocadia sinensis</i>		
有鱗目	壁虎科	無疣蝎虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>		
		蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>		
	石龍子科	中國石龍子台灣亞種	<i>Plestiodon chinensis formosensis</i>	Es	
	正蜥科	蓬萊草蜥	<i>Takydromus stejnegeri</i>	E	
	黃頰蛇科	花浪蛇	<i>Amphiesma stolatum</i>		
		臭青公	<i>Elaphe carinata</i>		
		赤背松柏根	<i>Oligodon formosanus</i>		
		南蛇	<i>Ptyas mucosus</i>		
		草花蛇	<i>Xenochrophis piscator</i>		
	蝙蝠蛇科	雨傘節	<i>Bungarus multicinctus</i>		
眼鏡蛇		<i>Naja atra</i>			III
合計					
3 目	10 科	16 種		2 種	2 種

註：特化性一欄「Es」指台灣特有亞種，保育等級一欄「III」屬於其他應予保育的保育類動物。

表2-1.17、施工中第8季兩棲爬蟲類調查結果(1/5)

中文名	樣線 1										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
黑眶蟾蜍	1	4			5	1	1		1		
小雨蛙	4				17	7		11	4	5	12
貢德氏赤蛙	7	5		1	3	3			4	2	
澤蛙	3	2			8	13		3			
無疣蝎虎				3		1	1		1	4	
蝎虎	22	32	44	16	29	39	35	22	27	21	23
中國石龍子 台灣亞種								1			
蓬萊草蜥							1				
臭青公			1				1				
赤背松柏根					1						
南蛇			1		1	1	1				
草花蛇	1	1									
眼鏡蛇	1										
13 種	7 種	5 種	3 種	3 種	7 種	7 種	6 種	4 種	5 種	4 種	2 種
	39 隻次	44 隻次	46 隻次	20 隻次	64 隻次	65 隻次	40 隻次	37 隻次	37 隻次	32 隻次	35 隻次
歧異度	0.58	0.40	0.09	0.27	0.63	0.52	0.25	0.42	0.39	0.43	0.28
優勢度	0.37	0.55	0.92	0.67	0.30	0.41	0.77	0.45	0.56	0.47	0.55
均勻度	0.69	0.57	0.19	0.56	0.74	0.62	0.32	0.70	0.56	0.72	0.93
豐富度	3.77	2.43	1.20	1.54	3.32	3.31	3.12	1.91	2.55	1.99	0.65

表2-1.17、施工中第8季兩棲爬蟲類調查結果(2/5)

中文名	樣線 2										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
黑眶蟾蜍	8	7	1		3	4	1	3	3		
小雨蛙	7			2	11		2	7	3		5
貢德氏赤蛙		1			7	2			2		
澤蛙	8				8	14				7	2
蝎虎	16	23	20	9	23	20	19	15	22	20	17
中國石龍子 台灣亞種					1	1				1	
蓬萊草蜥							1				
花浪蛇	2										
南蛇			1						1		
眼鏡蛇									1		
10 種	5 種	3 種	3 種	2 種	6 種	5 種	4 種	3 種	6 種	3 種	3 種
	41 隻次	31 隻次	22 隻次	11 隻次	53 隻次	41 隻次	23 隻次	25 隻次	32 隻次	28 隻次	24 隻次
歧異度	0.63	0.29	0.16	0.21	0.64	0.51	0.28	0.40	0.47	0.31	0.34
優勢度	0.26	0.60	0.83	0.70	0.28	0.37	0.69	0.45	0.50	0.57	0.55
均勻度	0.90	0.61	0.33	0.68	0.83	0.73	0.46	0.84	0.61	0.64	0.71
豐富度	2.48	1.34	1.49	0.96	2.90	2.48	2.20	1.43	3.32	1.38	1.45

表2-1.17、施工中第8季兩棲爬蟲類調查結果(3/5)

中文名	樣線 3											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
黑眶蟾蜍		6			8			1	1			
小雨蛙						3				2	6	
貢德氏赤蛙	2	2			6	2			1			
澤蛙	2	5			7	6			7	3		
無疣蝮虎										1		
蝮虎	18	25	31	9	18	27	21	17	17	26	20	
中國石龍子 台灣亞種					1	1			1			
蓬萊草蜥									2			
臭青公							1					
草花蛇								1				
雨傘節			1									
眼鏡蛇											1	
12 種	3 種	4 種	2 種	1 種	5 種	5 種	2 種	3 種	6 種	4 種	3 種	
	22 隻次	38 隻次	32 隻次	9 隻次	40 隻次	39 隻次	22 隻次	19 隻次	29 隻次	32 隻次	27 隻次	
歧異度	0.26	0.43	0.06	0.00	0.59	0.43	0.08	0.18	0.52	0.29	0.29	
優勢度	0.69	0.48	0.94	1.00	0.30	0.51	0.91	0.81	0.41	0.67	0.60	
均勻度	0.55	0.71	0.20	-	0.85	0.61	0.27	0.37	0.66	0.48	0.62	
豐富度	1.49	1.90	0.66	0.00	2.50	2.51	0.74	1.56	3.42	1.99	1.40	

表2-1.17、施工中第8季兩棲爬蟲類調查結果(4/5)

中文名	樣線 4											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
黑眶蟾蜍		3	1		2	1			1			
小雨蛙	12				7				5		3	
貢德氏赤蛙	4	5			3					2		
澤蛙	17	14			10	9			3	2		
無疣蝮虎		9	4	2	1	2	1	1		5	2	
蝮虎	14	33	18	10	16	23	20	20	18	25	23	
赤背松柏根	1											
南蛇	2		1									
8 種	6 種	5 種	4 種	2 種	6 種	4 種	2 種	2 種	4 種	4 種	3 種	
	50 隻次	64 隻次	24 隻次	12 隻次	39 隻次	35 隻次	21 隻次	21 隻次	27 隻次	34 隻次	28 隻次	
歧異度	0.64	0.56	0.34	0.20	0.64	0.39	0.08	0.08	0.41	0.37	0.26	
優勢度	0.26	0.34	0.59	0.72	0.28	0.50	0.91	0.91	0.49	0.57	0.69	
均勻度	0.82	0.80	0.56	0.65	0.82	0.64	0.28	0.28	0.68	0.61	0.54	
豐富度	2.94	2.21	2.17	0.93	3.14	1.94	0.76	0.76	2.10	1.96	1.38	

表2-1.17、施工中第8季兩棲爬蟲類調查結果(5/5)

中文名	樣線 5										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
黑眶蟾蜍		2			2	3		1			
小雨蛙									2	3	11
貢德氏赤蛙	1	1			3	2			2	1	
澤蛙	8	7			8	11			9	7	4
斑龜										2	2
無疣蝎虎		2	2			1	2	1			
蝎虎	19	26	28	12	18	28	23	19	22	24	22
草花蛇										1	
8 種	3 種	5 種	2 種	1 種	4 種	5 種	2 種	3 種	4 種	6 種	4 種
	28 隻次	38 隻次	30 隻次	12 隻次	31 隻次	45 隻次	25 隻次	21 隻次	35 隻次	38 隻次	39 隻次
歧異度	0.32	0.42	0.11	0.00	0.46	0.45	0.12	0.17	0.42	0.50	0.46
優勢度	0.54	0.51	0.88	1.00	0.42	0.45	0.85	0.82	0.47	0.44	0.41
均勻度	0.67	0.61	0.35	-	0.77	0.65	0.40	0.35	0.70	0.64	0.77
豐富度	1.38	2.53	0.68	0.00	2.01	2.42	0.72	1.51	1.94	3.16	1.89

表2-1.18、本計畫與96年環評調查結果比較

目名	科名	中文名	學名	特化性	保育等級	96年環評	本計畫	
無尾目	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>			*	*	
	狹口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>			*	*	
	赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>			*	*	
	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>			*	*	
龜鱉目	河龜科	斑龜	<i>Ocadia sinensis</i>				*	
有鱗目	壁虎科	無疣蜥虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>				*	
		蜥虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>			*	*	
	石龍子科	中國石龍子台灣亞種	<i>Plestiodon chinensis formosensis</i>	Es		*	*	
	正蜥科	蓬萊草蜥	<i>Takydromus stejnegeri</i>	E		*	*	
	黃頰蛇科	花浪蛇	<i>Amphiesma stolatum</i>					*
		臭青公	<i>Elaphe carinata</i>					*
		赤背松柏根	<i>Oligodon formosanus</i>					*
		南蛇	<i>Ptyas mucosus</i>					*
		草花蛇	<i>Xenochrophis piscator</i>					*
	蝙蝠蛇科	眼鏡蛇	<i>Naja atra</i>			III	*	*
		雨傘節	<i>Bungarus multicinctus</i>			III		*
合計								
3 目	10 科	16 種		2 種	2 種	8 種	16 種	

- 註1：特化性一欄「E」指台灣特種，「Es」指台灣特有亞種。
 2：保育等級一欄「III」屬於其他應予保育的保育類動物。
 3：保育類野生動物名錄依農委會於97年7月2日公告修正。
 4：本計畫調查期間至今共11季次。




圖2-1.6、歷季兩棲爬蟲類調查種類及數量

2-2 水域生物調查

本季水域生態調查結果，魚類共計2目3科4種，蝦蟹螺貝類共計5目10科11種，並未發現水生昆蟲。

2-2.1、魚類

1.種屬組成

本季調查共記錄2目3科4種30尾(表2-2.1)，分別為鰕虎科的彈塗魚與大彈塗魚；慈鯛科的吳郭魚與鯢科的大鱗鯪。其中以彈塗魚(53.3%)最為優勢。各測站的種屬組成如下：

- (1).福寶橋：共計1目2科3種，分別為彈塗魚、大彈塗魚與吳郭魚，其中以彈塗魚(70.0%)最為優勢。
- (2).福豐橋：共計2目3科3種，分別為彈塗魚、大鱗鯪與吳郭魚，其中以彈塗魚(45.0%)最為優勢。

2.與上季資料比較：

本季數量與種數皆較上季為少(表2-2.1)，其中彈塗魚數量較去年多，而吳郭魚與大鱗鯪的數量皆較去年為少，上季記錄的虱目魚在本季並未發現。

3.與去年同季資料比較：

本季記錄數量皆較去年同季略多，在物種方面，本季較去年同季的物種少，去年同季記錄的花身雞魚在本季並未記錄(表2-2.1)。

4.與過去環評資料比較：

過去環評階段，於福寶橋與福豐橋共記錄3科6種魚類，而本計畫共記錄6科9種魚類(表2-2.2)，其中過去環評調查到的尼羅口孵魚、前鱗鯪、烏魚與鯢科幼魚本計畫調查並未發現，而本計畫新增物種有大青彈塗魚、黑塘鱧、吳郭魚、線鱧、花身雞魚、虱目魚與大鱗鯪。

表 2-2.1、水域生態調查魚類資源

目名	科名	中文名	學名	特 化 性	保 育 等 級	98年	98年	98年	99年	99年	99年	99年	99年	100年	100年	100年	100年										
						第2季	第3季	第4季	第1季	第2季	第3季	第4季	第1季	第2季	第3季	第4季											
						福寶橋	福豐橋	福寶橋	福豐橋	福寶橋	福豐橋	福寶橋	福豐橋	福寶橋	福豐橋	福寶橋	福豐橋										
鱸形目	鰕虎科	大青彈塗魚	<i>Scartelaos gigas</i>			1	1																				
		彈塗魚	<i>Periophthalmus modestus</i>			5	2	6	2	2	6	4	8	5	11	9	12	7	8	5	3	8	6	5	8	7	9
		大彈塗魚	<i>Boleophthalmus pectinirostris</i>					2		1						2		1		1		2	1		1		
		黑塘鱧	<i>Eleotris melanosoma</i>						1							1											
	慈鯛科	吳郭魚*	<i>Oreochromis sp.</i>			2	3	5	9	4	8	6	5	4	4	5	7	4	4	4	2	4	5	4	11	2	6
	鱧科	線鱧*	<i>Channa striata</i>									1															
	條紋雞魚科	花身雞魚	<i>Terapon jarbua</i>														1										
鼠鱈目	虱目魚科	虱目魚	<i>Chanos chanos</i>																						2		
鯔形目	鯔科	大鱗鯔	<i>Liza macrolepis</i>				1			1							3				5			9		5	
合計																											
3目	6科	9種		0種	0種	3種	4種	3種	3種	3種	2種	3種	2種	2種	2種	4種	4種	3種	2種	3種	3種	3種	3種	4種	3種	3種	
						8尾	7尾	13尾	12尾	7尾	15尾	10尾	14尾	9尾	15尾	14尾	22尾	15尾	13尾	9尾	6尾	17尾	13尾	10尾	30尾	10尾	20尾

註：中文名一欄中，標示*者表外來魚種。

表2-2.2、本計畫與過去環評資料魚類資源比較表

目名	科名	中文名	學名	過去環評	本計畫
鱸形目	鰕虎科	大青彈塗魚	<i>Scartelaos gigas</i>		*
		大彈塗魚	<i>Boleophthalmus pectinirostris</i>	*	*
		彈塗魚	<i>Periophthalmus modestus</i>	*	*
		黑塘鱧	<i>Eleotris melanosoma</i>		*
	慈鯛科	吳郭魚*	<i>Oreochromis sp.</i>		*
		尼羅河口鱒魚*	<i>Oreochromis niloticus</i>	*	
	鱧科	線鱧*	<i>Channa striata</i>		*
條紋雞魚科	花身雞魚	<i>Terapon jarbua</i>		*	
鼠鱈目	虱目魚科	虱目魚	<i>Chanos chanos</i>		*
鯔形目	鯔科	大鱗鯔	<i>Liza macrolepis</i>		*
		前鱗鯔	<i>Liza affinis</i>	*	
		烏魚	<i>Mugil cephalus</i>	*	
		鯔科幼魚	<i>Chelon sp.</i>	*	
合計					
3 目	6 科	13 種		6 種	9 種

註1：中文名一欄中，標示*者表外來魚種。

2：本計畫調查期間至今共11季次。

2-2.2、底棲生物

1.種屬組成

本季調查共記錄中腹足目、鶯蛤目、沙蠶目、十足目與無柄目等5目10科11種84隻(表2-2.3)，分別為錐蝨科的流紋蝨；玉黍螺科的粗紋玉黍螺；海蝨科的栓海蝨；牡蠣科的黑齒牡蠣；蜆科的紅樹蜆；櫻蛤科的櫻蛤；沙蠶科的沙蠶；方蟹科的雙齒近相手蟹；沙蟹科的弧邊招潮蟹與清白招潮蟹；藤壺科的藤壺。其中以流紋蝨(29.8%)最為優勢。各測站的種屬組成如下：

- (1).福寶橋：共計5目10科11種，分別為流紋蝨、粗紋玉黍螺、栓海蝨、黑齒牡蠣、紅樹蜆、櫻蛤、砂蠶、雙齒近相手蟹、弧邊招潮蟹、清白招潮蟹與藤壺，其中以清白招潮蟹(23.3%)最為優勢。
- (2).福豐橋：共計2目3科4種，分別為流紋蝨、雙齒近相手蟹、弧邊招潮蟹與清白招潮蟹，其中以流紋蝨(41.5%)最為優勢。

2.與上季資料比較:

本季在數量與種類皆較上季多 (表2-2.3)；上一季未記錄的栓海蝨、黑齒牡蠣、紅樹蜆、櫻蛤與沙蠶，在本季都有發現。

3.與去年同季資料比較:

本季在數量與種類皆較去年同季減少 (表2-2.3)，其中本季與去年同季比較之後，新記錄清白招潮蟹一種，而去年同季調查發現的豆石蟹螺、福壽螺、網目海蝨、石蟻、雙齒圍沙蠶、摺痕擬相手蟹、淡水泥蟹與方格星蟲等8種，本季並未調查到，可能是受到本年度的河道整修工程影響導致物種減少。

4.與過去環評資料比較:

過去環評階段，於福寶橋與福豐橋共記錄21科35種底棲生物，而本計畫共記錄16科23種底棲生物(表2-2.4)，其差異性推測可能受到附近河岸整平工程影響水質，導致物種數減少。

表2-2.3、水域生態調查底棲生物資源

目名	科名	中文名	學名	特 化 性	保 育 等 級	98年 第2季		98年 第3季		98年 第4季		99年 第1季		99年 第2季		99年 第3季		99年 第4季		100年 第1季		100年 第2季		100年 第3季		100年 第4季			
						福 寶 橋	福 豐 橋																						
原始腹足目	蜆螺科	豆石蜆螺	<i>Clithon retropictus</i>																5		8								
中腹足目	錐蝸科	流紋蝸	<i>Thiara riqueti</i>			32	3	9	25	11	31	7	19	5	17	8	22	14	16	10	7	22	27	11	9	8	17		
	蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>						3		2		6		2		3		1		1								
	玉黍螺科	粗紋玉黍螺	<i>Littorina scabra</i>									7		10		5		8		7		6		2		3			
	海蝸科	栓海蝸	<i>Certhidea cingulata</i>															1		2							1		
網目海蝸		<i>Certhidea rhizophorarum</i>																3		2									
縮柄眼目	石蠟科	石蠟	<i>Onchidium sp.</i>									1					2		1		1								
鶯蛤目	牡蠣科	黑齒牡蠣	<i>Saccostrea mordax</i>					2		1									3		1					1			
	蜆科	紅樹蜆	<i>Galoina coaxons</i>									1		1					2		1		2			1			
	櫻蛤科	櫻蛤	<i>Tellina jedoensis</i>									3		1		2		1		2						1			
沙蠶目	沙蠶科	沙蠶	<i>Nereis sp.</i>				8	11	1	6		4		7		5		5		3		6				3			
		雙齒圍沙蠶	<i>Perinereis aibuhitensis</i>										1		1		2		1										
十足目	方蟹科	台灣厚蟹	<i>Helice formosensis</i>	特 有		2	1		1			3		1															
		雙齒近相手蟹	<i>Perisesarma bidens</i>			6	2	3	2		4	5	1	3	2	5	6	8	4	6	2	10	10	5	3	8	5		
		摺痕擬相手蟹	<i>Parasesarma plicatum</i>										2		2		1		2	3									
	沙蟹科	北方呼喚招潮蟹	<i>Uca borealis</i>				1																						
		弧邊招潮蟹	<i>Uca arcuata</i>			7	11	15	18	10	14	9	16	11	12	17	9	12	7	4	2	7	5	6	5	6	8		
		淡水泥蟹	<i>Ilyoplax tansuiensis</i>						1		1	2	3	1	1	2	1	3	1	2									
		清白招潮蟹	<i>Uca lactea</i>																							15	10	11	
寄居蟹科	寄居蟹	<i>Pagurus sp.</i>								1			1																
無柄目	藤壺科	藤壺	<i>spp.</i>				8		5		3		4		8		4		5		4		3		1				
端腳目	螺贏蜚科	端腳類	<i>spp.</i>									2																	
方格星蟲目	方格星蟲科	方格星蟲	<i>Sipunculus sp.</i>									4		2		2		1											
合計																													
9目	16科	22種			1 種	4 種	6 種	6 種	7 種	5 種	6 種	15 種	5 種	14 種	5 種	12 種	5 種	17 種	6 種	14 種	4 種	7 種	3 種	5 種	4 種	11 種	4 種		
						47 隻	26 隻	48 隻	51 隻	33 隻	53 隻	54 隻	45 隻	50 隻	34 隻	59 隻	41 隻	74 隻	32 隻	54 隻	12 隻	57 隻	42 隻	27 隻	32 隻	43 隻	41 隻		

表2-2.4、本計畫與過去環評資料底棲生物比較表(1/2)

目名	科名	中文名	學名	過去環評	本計畫
原始腹足目	蜆螺科	豆石蜆螺	<i>Clithon retropictus</i>	*	*
中腹足目	玉黍螺科	粗紋玉黍螺	<i>Littorina scabra</i>	*	*
		山椒蝸牛科	黃山椒蝸牛	<i>Assiminea lutea</i>	*
		未知種山椒蝸牛	ssp.	*	
	海蝓科	栓海蝓	<i>Certhidea cingulata</i>	*	*
		網目海蝓	<i>Certhidea rhizophorarum</i>	*	*
	錐蝓科	流紋蝓	<i>Thiara riqueti</i>		*
蘋果螺科	福壽螺	<i>Pila canaliculata</i>	*	*	
縮柄眼目	石蟻科	石蟻	<i>Onchidium sp.</i>	*	*
簾蛤目	曇蛤科	中華曇蛤	<i>Glaucomya chinensis</i>	*	
	櫻蛤科	櫻蛤	<i>Tellina jedomensis</i>	*	*
	蜆科	紅樹蜆	<i>Galoina coaxons</i>	*	*
	薄殼蛤科	公代	<i>Laternula marilina</i>	*	
鶯蛤目	牡蠣科	黑齒牡蠣	<i>Saccostrea mordax</i>		*
沙蠶目	沙蠶科	沙蠶	<i>Nereis sp.</i>		*
		單葉沙蠶	<i>Namalycastis aibiuma</i>	*	
		雙齒圍沙蠶	<i>Perinereis aibuhitensis</i>	*	*
		刺沙蠶	<i>Neanthes sp.</i>	*	
		沙蠶	ssp.	*	
海稚蟲目	海稚蟲科	海稚蟲	ssp.	*	
星蟲動物門	星蟲動物	星蟲	ssp.	*	
方格星蟲目	方格星蟲科	方格星蟲	<i>Sipunculus sp.</i>		*
紐蟲動物門	紐蟲動物	紐蟲	ssp.	*	
蠃蟲動物門	蠃蟲動物	蠃蟲	ssp.	*	
十足目	方蟹科	字紋弓蟹	<i>Varuna litterata</i>	*	
		台灣厚蟹	<i>Helice formosensis</i>	*	*
		伍氏厚蟹	<i>Helice wuana</i>	*	
		利其厚蟹	<i>Helice leachii</i>	*	
		秀麗長方蟹	<i>Metaplax elegans</i>	*	
		摺痕擬相手蟹	<i>Parasesarma plicatum</i>		*
		雙齒近相手蟹	<i>Perisesarma bidens</i>	*	*
		沙蟹科	北方呼喚招潮蟹	<i>Uca borealis</i>	*
		弧邊招潮蟹	<i>Uca arcuata</i>		*
		清白招潮	<i>Uca lacter</i>	*	*
		萬歲大眼蟹	<i>Macrophthalmus banzai</i>	*	
		台灣泥蟹	<i>Ilyoplax formosensis</i>	*	
		淡水泥蟹	<i>Ilyoplax tansuiensis</i>	*	*
		長指股窗蟹	<i>Scopimera longidactyla</i>	*	

表2-2.4、本計畫與過去環評資料底棲生物比較表(2/2)

目名	科名	中文名	學名	過去環評	本計畫
十足目	寄居蟹科	寄居蟹	<i>Pagurus</i> sp		*
	槍蝦科	槍蝦	ssp .	*	
端腳目	螺贏蜚科	端腳類	ssp .	*	*
無柄目	藤壺科	藤壺	ssp.	*	*
合計					
15 目	24 科	42 種		35 種	23 種

註：本計畫調查期間至今共11季次。

2-2.3、水生昆蟲

1.種屬組成

本季調查並未記錄任何水生昆蟲。

2.與上季資料比較:

上季兩樣站亦未採獲任何水生昆蟲(表2-2.5)。

3.與去年同季資料比較:

本季在數量與種數上皆較去年同季減少,去年同季調查記錄的水黽,本季並無記錄。

4.與過去環評資料比較:

由於過去環評並未針對水生昆蟲進行調查,因此無比較資料。

表2-2.5、水域生態調查水生昆蟲資源

目名	科名	中文名	學名	特性	保育等級	98年		98年		98年		99年		99年		99年		99年		100年		100年		100年		100年		
						第2季	第3季	第3季	第4季	第4季	第1季	第2季	第2季	第3季	第3季	第4季	第4季	第1季	第2季	第2季	第3季	第3季	第4季	第4季	第4季	第4季	第4季	第4季
半翅目	水黽科	水黽	<i>Gerris sp.</i>			福寶橋	福豐橋	福寶橋	福豐橋	福寶橋	福豐橋	福寶橋	福豐橋	福寶橋	福豐橋													
	仰泳椿科	小仰泳椿	<i>Anisops sp.</i>			7																						
	划椿科	划椿	sp.								6	10																
	負子蟲科	大負子蟲	<i>Sphaerodema rustica</i>													3												
合計																												
1目	4科		4種	0種	0種	2種	0種	0種	1種	0種	1種	0種	2種	0種	2種	1種	1種	0種	1種	0種	1種	0種	0種	0種	0種	0種	0種	0種
						8隻	0隻	0隻	2隻	0隻	1隻	0隻	9隻	0隻	12隻	3隻	2隻	0隻	4隻	0隻	1隻	0隻	0隻	0隻	0隻	0隻	0隻	0隻

2-2.4、水質

本季監測結果如表 2-2.6 所示。就本季分析結果數據分別討論如下：

1.水溫

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之溫度檢測結果分別為 25.8°C、24.4°C、24.5°C、24.3°C、25.6°C、25.4°C。綜合 94 年差異分析、96 年環評報告與本計畫，福寶橋(舊濁水溪中游)水溫介於 15.3°C~33.7°C 之間，福豐橋(漢寶溪下游)水溫介於 15.5°C~33.7°C 之間，其水溫隨著季節不同而有所變化(表 2-2.6)。

2.pH 值

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之 pH 值檢測結果分別為 7.2、7.2、7.3、7.1、7.1、7.1。綜合 94 年差異分析、96 年環評報告與本計畫，福寶橋(舊濁水溪中游)pH 值介於 6.9~7.9 之間，福豐橋(漢寶溪下游) pH 值則介於 7.1~8.0 之間(表 2-2.6)。根據陸域地面水體乙類水質標準，pH 值為介於 6.0~9.0，本次調查所有樣站均符合。

3.溶氧

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之溶氧檢測結果分別為 5.1mg/L、2.4mg/L、1.9mg/L、1.6mg/L、2.1mg/L、2.6mg/L。綜合 94 年差異分析、96 年環評報告與本計畫，福寶橋(舊濁水溪中游)溶氧介於 2.3mg/L~7.3mg/L 之間，福豐橋(漢寶溪下游)溶氧則介於 1.5mg/L~7.8mg/L 之間(表 2-2.6) (圖 2-2.1~2)。根據陸域地面水體乙類水質標準，溶氧量為 5.5 以上，而本次調查所有樣站均不符合標準。

4.生化需氧量

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之生化需氧量檢測結果分別為 4.8mg/L、6.1mg/L、6.0mg/L、5.9mg/L、3.2mg/L、3.8mg/L。綜合 94 年差異分析、96 年環評報告與本計畫，福寶橋(舊濁水溪中游)生化需氧量介於 3.3mg/L~17.8mg/L 之間，福豐橋(漢寶溪下游)生化需氧量則介於 2.8mg/L~12.9mg/L 之間(表 2-2.6) (圖 2-2.1~2)。根據陸域地面水體乙類水質標準，生化需氧量為 2 以下，本次調查所有樣站均未符合標準。

5.化學需氧量

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之化學需氧量檢測結果分別為 24.2mg/L、35.2mg/L、57.9mg/L、28.6mg/L、32.4mg/L、31.4mg/L。綜合 94 年差異分析、96 年環評報告與本計畫，福寶橋(舊濁水溪中游)化學需氧量介於 11.8mg/L~81.2mg/L 之間，福豐橋(漢寶溪下游)化學需氧量則介於 11.3mg/L~72.0mg/L 之間(表 2-2.6)。

6.懸浮固體

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之懸浮固體檢測結果分別為 59.3mg/L、81.6mg/L、1980mg/L、14.9mg/L、70.1mg/L、40.0mg/L。綜合 94 年差異分

析、96年環評報告與本計畫，福寶橋(舊濁水溪中游)懸浮固體介於 18.2mg/L~656mg/L 之間，福豐橋(漢寶溪下游)懸浮固體則介於 15.9mg/L ~44.5mg/L 之間(表 2-2.6) (圖 2-2.1~2)。根據陸域地面水體乙類水質標準，懸浮固體為 25 以下，本次調查僅第一漢寶橋(漢寶溪上游)樣站符合標準，其餘樣站則未符合。

7. 導電度

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之導電度檢測結果分別為 874 μ mho/cm、1190 μ mho/cm、2580 μ mho/cm、916 μ mho/cm、1140 μ mho/cm、4440 μ mho/cm。綜合 94 年差異分析、96 年環評報告與本計畫，福寶橋(舊濁水溪中游)導電度介於 688~14600 之間，福豐橋(漢寶溪下游)導電度介於 423~10500 之間(表 2-2.6)。

8. 鹽度

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之鹽度檢測結果分別為 0.2psu、0.4psu、1.2psu、0.2psu、0.4psu、1.8psu。

9. 氧化還原電位

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之氧化還原電位檢測結果分別為 154mv、148mv、157mv、144mv、150mv、158mv。

10. 氨氮

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之氨氮檢測結果分別為 7.81mg/L、7.16mg/L、6.82mg/L、7.66mg/L、6.44mg/L、0.96mg/L。綜合 94 年差異分析、96 年環評報告與本計畫，福寶橋(舊濁水溪中游)氨氮介於 2.57mg/L~12.0mg/L 之間，福豐橋(漢寶溪下游)氨氮則介於 0.96mg/L~9.86mg/L 之間(表 2-2.6) (圖 2-2.1~2)。根據陸域地面水體乙類水質標準，氨氮含量為 0.3 以下，本次調查所有樣站均未符合標準。

11. 汞

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之汞檢測結果皆為 ND<0.0003mg/L(表 2-2.6)。

12. 銅

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之銅檢測結果皆為<0.05mg/L，而第一漢寶橋(漢寶溪上游)側站則為<0.01mg/L(表 2-2.6)。

13. 鋅

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、漢寶溪中游測站之鋅檢測結果均為<0.05mg/L，而第一漢寶橋(漢寶溪上游)、福豐橋(漢寶溪下游)測站則分別為 0.06mg/L、0.13mg/L(表 2-2.6)。

14. 鎘

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之溶氧檢測結果皆為

ND<0.006mg/L(表 2-2.6)。

15.鉛

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游測站之鉛檢測結果皆為 ND<0.08mg/L，而福豐橋(漢寶溪下游)測站則為<0.10mg/L(表 2-2.6)。

16.錳

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之錳檢測結果分別為 0.20mg/L、0.20mg/L、0.23mg/L、0.23mg/L、0.40mg/L、0.42mg/L(表 2-2.6)。

17.大腸桿菌群

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之大腸桿菌群檢測結果分別為 1.8×10^4 CFU/100mL、 7.5×10^4 CFU/100mL、 6.6×10^3 CFU/100mL、 2.7×10^6 CFU/100mL、 2.6×10^5 CFU/100mL、 5.2×10^4 CFU/100mL。綜合 94 年差異分析、96 年環評報告與本計畫，福寶橋(舊濁水溪中游)大腸桿菌群介於 3.9×10^3 CFU/100mL ~ 4.8×10^5 CFU/100mL 之間，福豐橋(漢寶溪下游)大腸桿菌群則介於 9.5×10^3 CFU/100mL ~ 4.9×10^6 CFU/100mL 之間(表 2-2.6)。根據陸域地面水體乙類水質標準，大腸桿菌群為 5000 以下，本次調查所有樣站均未符合標準。

18.氯鹽

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之氯鹽檢測結果分別為 50.2mg/L、150mg/L、719mg/L、34.4mg/L、71.1mg/L、1690mg/L(表 2-2.6)。

19.濁度

本季裕農橋(舊濁水溪上游)、福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游、福豐橋(漢寶溪下游)測站之濁度檢測結果分別為 45NTU、60NTU、450NTU、17NTU、45NTU、26NTU(表 2-2.6)。

河川污染指標(RPI, River Pollution Index)

水質評估指標係依據「區域排水整治及環境營造規劃參考手冊」之相關辦法，選定以河川污染指標(RPI)檢定之，其計算與評估方式簡介如下：

RPI 為環保單位最常使用的河川水質指標。此指標乃早期引自日本的河川污染分類法，它是以溶氧量、生化需氧量、懸浮固體及氮氮等四項水質參數加以評定。RPI 特點為計算方法簡單易懂，四項參數權重相等，RPI 值介於 1 至 10 之間，民眾較易瞭解水質之變化。

本季各水質測站之 RPI 如表 2-2.7 所示，福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游第一漢寶橋(漢寶溪上游)與漢寶溪中游測站水質為嚴重污染等級；而裕農橋(舊濁水溪上游)與福豐橋(漢寶溪下游)測站水質則為中度污染等級。根據 94 年差異分析與 96 年環評報告，福寶橋(舊濁水溪)測站水質介於中度污染與嚴重污染等級，福豐橋(漢寶溪)測站水質同樣介於中度污染與嚴重污染等級之間(表 2-2.8)。

表 2-2.6、施工中第 8 季水質分析表(1/2)

檢驗項目	測站	裕農橋 (舊濁水溪上游)	福寶橋 (舊濁水溪中游)	舊濁水溪下游
	單位			
水溫	°C	25.8	24.4	24.5
pH 值		7.2	7.2	7.3
溶氧	mg/L	5.1	2.4	1.9
生化需氧量	mg/L	4.8	6.1	6.0
化學需氧量	mg/L	24.2	35.2	57.9
懸浮固體	mg/L	59.3	81.6	1980
導電度	umho/cm	874	1190	2580
鹽度	psu	0.2	0.4	1.2
氧化還原電位	mv	154	148	157
氨氮	mg/L	7.81	7.16	6.82
汞	mg/L	ND	ND	ND
銅	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
鋅	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
鎘	mg/L	ND	ND	ND
鉛	mg/L	ND	ND	ND
錳	mg/L	0.20	0.20	0.23
大腸桿菌群	CFU/100mL	1.8×10 ⁴	7.5×10 ⁴	6.6×10 ³
氯鹽	mg/L	50.2	150	719
濁度	NTU	45	60	450

註：水質採樣時間為乾潮期

表 2-2.6、施工中第 8 季水質分析表(2/2)

檢驗項目	測站	第一漢寶橋 (漢寶溪上游)	漢寶溪中游	福豐橋 (漢寶溪下游)
	單位			
水溫	°C	24.3	25.6	25.4
pH 值		7.1	7.1	7.1
溶氧	mg/L	1.6	2.1	2.6
生化需氧量	mg/L	5.9	3.2	3.8
化學需氧量	mg/L	28.6	32.4	31.4
懸浮固體	mg/L	14.9	70.1	40.0
導電度	µmho/cm	916	1140	4440
鹽度	psu	0.2	0.4	1.8
氧化還原電位	mv	144	150	158
氨氮	mg/L	7.66	6.44	0.96
汞	mg/L	ND	ND	ND
銅	mg/L	ND	<0.05	<0.05
鋅	mg/L	0.06	<0.05	0.13
鎘	mg/L	ND	ND	ND
鉛	mg/L	ND	ND	<0.10
錳	mg/L	0.23	0.40	0.42
大腸桿菌群	CFU/100mL	2.7×10 ⁶	2.6×10 ⁵	5.2×10 ⁴
氯鹽	mg/L	34.4	71.1	1690
濁度	NTU	17	45	26

註：水質採樣時間為乾潮期

表 2-2.7、施工中第 8 季水質污染指標等級

項目 \ 測站	裕農橋 (舊濁水溪上游)	福寶橋 (舊濁水溪中游)	舊濁水溪 下游	第一漢寶橋 (漢寶溪上游)	漢寶溪 中游	福豐橋 (漢寶溪下游)
溶氧	3	6	10	10	6	6
生化需氧量	3	6	6	6	3	3
懸浮固體	6	6	10	1	6	3
氨氮	10	10	10	10	10	3
RPI 點數	22	28	36	27	25	15
RPI 污染 指標積分值	5.5	7	9	6.75	6.25	3.75
污染等級	中度污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	中度污染

表 2-2.8、本計畫之福寶橋、福豐橋與過去差異分析、環評資料比較(1/4)

檢驗項目	測站 單位	福寶橋(舊濁水溪)							
		94/7/4/10	94/8/8/05	94/9/14/12	96/3/7	96/4/9	96/5/1	98/5/18	98/8/17
水溫	°C	32.2	29.8	33	15.8	20.7	28.7	28.7	33.7
pH 值		7.6	6.9	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
溶氧	mg/L	5.6	2.3	3.9	4.4	5.1	6.4	3.4	7.3
生化需氧量	mg/L	4.4	10.4	6.1	14.3	5.6	17.8	7.9	6.0
化學需氧量	mg/L	11.8	34.2	19.9	56.2	22.4	81.2	34.6	25.0
懸浮固體	mg/L	18.2	102	88	143	45.2	94	50.4	32.5
導電度	µmho/cm	5720	1340	1610	4830	1180	2430	14600	1680
鹽度	psu							8.6	0.7
氧化還原電位	mv							177	179
氨氮	mg/L	2.57	4.24	2.75	11	7.41	11.2	5.22	2.75
汞	mg/L							ND	ND
銅	mg/L							<0.05	ND
鋅	mg/L							ND	0.09
鎘	mg/L							ND	ND
鉛	mg/L							ND	ND
錳	mg/L							0.27	1.53
大腸桿菌群	CFU/100mL	5.5×10 ⁴	3.9×10 ³	3.9×10 ⁴	2.4×10 ⁴	2.9×10 ⁴	3.7×10 ⁴	8.2×10 ³	7.7×10 ³
氯鹽	mg/L							4770	265
硝酸鹽	mg/L	0.53	0.21	0.51	0.65	1.27	0.73		
濁度	NTU							30	30
流量	m ³ /min				115	117	98.1		
流速	m/min				0.26	0.22	0.22		
真色色度	Color unit				<25	<25	30		
高濃度鹵離子 水中化學需氧量	mg/L				—	0	—		
RPI 點數		13	32	24	32	22	29	28	16
RPI 污染指標積分值		3.25	8	6	8	5.5	7.25	7	4
河川水質污染程度		中度污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	中度污染	嚴重污染	嚴重污染	中度污染

表 2-2.8、本計畫之福寶橋、福豐橋與過去差異分析、環評資料比較(2/4)

檢驗項目	測站 單位	福寶橋(舊濁水溪)								
		98/11/24	99/2/23	99/5/12	99/8/6	99/11/12	100/2/21	100/5/24	100/8/11	100/11/21
水溫	°C	23.4	20.3	28.8	31.6	21.4	15.3	25.2	32	24.4
pH 值		7.5	7.2	7.9	7.6	7.6	7.7	7.3	7.3	7.2
溶氧	mg/L	5.0	7.0	7.1	4.8	6	3.6	5	2.7	2.4
生化需氧量	mg/L	12.8	3.3	6	5.5	4.8	11.1	5.8	4.7	6.1
化學需氧量	mg/L	53.8	16.3	25.9	20.5	27.4	64.5	34.1	57.5	35.2
懸浮固體	mg/L	41.6	35.4	102	60.7	66.2	81	81	656	81.6
導電度	µmho/cm	1460	1090	9850	844	3400	5360	699	688	1190
鹽度	psu	0.5	0.3	5.6	0.2	1.6	2.8	0.1	0.1	0.4
氧化還原電位	mv	151	182	141	261	116	104	146	147	148
氨氮	mg/L	12.0	3.1	6.1	2.7	5.58	5.41	4.57	3.69	7.16
汞	mg/L	ND								
銅	mg/L	ND	<0.05	<0.05	ND	ND	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
鋅	mg/L	0.46	0.06	0.08	0.06	<0.05	0.14	0.12	0.13	<0.05
鎘	mg/L	ND								
鉛	mg/L	ND								
錳	mg/L	0.37	0.25	0.31	0.32	0.35	0.38	0.21	0.44	0.2
大腸桿菌群	CFU/100mL	3.9×10 ⁵	8.3×10 ³	4.3×10 ³	4.7×10 ³	2.0×10 ⁴	4.8×10 ⁵	5.2×10 ⁴	2.1×10 ⁴	7.5×10 ⁴
氯鹽	mg/L	193	137	2880	78.7	1030	1380	65.4	112	150
硝酸鹽	mg/L									
濁度	NTU	32	30	60	36	45	55	19	500	60
流量	m ³ /min									
流速	m/sec									
真色色度	Color unit									
高濃度鹵離子 水中化學需氧量	mg/L									
RPI 點數		22	17	27	21	22	28	25	29	28
RPI 污染指標 積分值		5.5	4.25	6.75	5.25	5.5	7	6.25	7.25	7
河川水質 污染程度		中度污染	中度污染	嚴重污染	中度污染	中度污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染

表 2-2.8、本計畫之福寶橋、福豐橋與過去差異分析、環評資料比較(3/4)

檢驗項目	測站 單位	福豐橋(漢寶溪)							
		94/7/4/10	94/8/8/05	94/9/14/13	96/3/7	96/4/9	96/5/1	98/5/18	98/8/17
水溫	°C	31.5	27.8	33.1	15.6	20.8	28.1	27.2	33.7
pH 值		7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3
溶氧	mg/L	5.8	1.5	4.1	4.5	4.6	6.2	5.2	3.8
生化需氧量	mg/L	3.1	6.7	6.9	12.9	6.3	10.2	4.2	2.8
化學需氧量	mg/L	11.3	23	24.9	—	28.9	45.4	30	22.8
懸浮固體	mg/L	38.2	52	44.5	41	18	23	15.9	13.9
導電度	µmho/cm	3100	423	2850	10500	3520	3560	5800	2860
鹽度	psu							3.1	1.4
氧化還原電位	mv							194	168
氨氮	mg/L	2.94	5.18	3.13	8.62	5.33	8.26	3.84	3.92
汞	mg/L							ND	ND
銅	mg/L							ND	ND
鋅	mg/L							ND	<0.05
鎘	mg/L							ND	ND
鉛	mg/L							ND	ND
錳	mg/L							0.5	0.66
大腸桿菌群	CFU/100mL	4.8×10 ⁴	4.3×10 ⁴	1.2×10 ⁴	3.9×10 ⁵	6.9×10 ⁴	4.4×10 ⁵	2.1×10 ⁴	7.4×10 ⁴
氯鹽	mg/L							1550	588
硝酸鹽	mg/L	4.64	0.74	0.85	0.97	1.1	0.29		
濁度	NTU							19	13
流量	m ³ /min				51.4	27.7	51.4		
流速	m/sec				0.14	0.45	0.14		
真色色度	Color unit				<25	<25	27		
高濃度鹵離子 水中化學需氧量	mg/L				56.3	—	56.3		
RPI 點數		15	32	25	29	20	22	17	18
RPI 污染指標積分值		3.75	8	6.25	7.25	5	5.5	4.25	4.5
河川水質污染程度		中度污染	嚴重污染	嚴重污染	嚴重污染	中度污染	中度污染	中度污染	中度污染

表 2-2.8、本計畫之福寶橋、福豐橋與過去差異分析、環評資料比較(4/4)

檢驗項目	測站 單位	福豐橋(漢寶溪)								
		98/11/24	99/2/23	99/5/12	99/8/6	99/11/12	100/2/21	100/5/24	100/8/11	100/11/21
水溫	°C	25.7	21.7	30	32.2	22.6	15.5	24.3	33.4	25.4
pH 值		7.5	7.5	7.7	7.6	7.4	8	7.3	7.6	7.1
溶氧	mg/L	4.7	5.9	5.1	4.1	4.5	7.8	2.4	3.1	2.6
生化需氧量	mg/L	10.2	4.6	5.5	3.9	4.5	7.2	11.2	6.1	3.8
化學需氧量	mg/L	31.5	29	29.5	15.7	17.4	33.6	72	40.5	31.4
懸浮固體	mg/L	28.1	16.3	27.9	25	17.2	24.7	17.8	17.6	40
導電度	µmho/cm	1870	5890	3540	1870	3170	9910	4180	3070	4440
鹽度	psu	0.8	3.2	1.8	0.8	1.5	5.5	2.1	1.5	1.8
氧化還原電位	mv	156	122	154	251	122	93.8	153	152	158
氨氮	mg/L	9.86	2.97	7.05	1.93	3.98	2.59	4.88	4.06	0.96
汞	mg/L	ND								
銅	mg/L	ND	<0.05	ND	ND	ND	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
鋅	mg/L	<0.05	<0.05	0.14	0.07	0.05	0.08	0.15	0.06	0.13
鎘	mg/L	ND								
鉛	mg/L	ND	<0.10							
錳	mg/L	0.72	0.62	0.42	0.48	0.46	0.64	0.84	0.45	0.42
大腸桿菌群	CFU/100mL	3.9×10 ⁴	2.2×10 ⁴	7.4×10 ⁴	1.1×10 ⁴	9.5×10 ³	4.9×10 ⁶	2.7×10 ⁵	3.9×10 ⁵	5.2×10 ⁴
氯鹽	mg/L	226	1590	801	314	845	2920	980	874	1690
硝酸鹽	mg/L									
濁度	NTU	24	13	23	20	14	24	18	8.1	26
流量	m ³ /min									
流速	m/min									
真色色度	Color unit									
高濃度鹵離子 水中化學需氧量	mg/L									
RPI 點數		22	13	22	18	20	16	23	23	15
RPI 污染指標 積分值		5.5	3.25	5.5	4.5	5	4	5.75	5.75	3.75
河川水質 污染程度		中度污染								




圖2-2.1福寶橋(舊濁水溪) 水質歷季與環評資料曲線圖



圖2-2.2福豐橋(漢寶溪) 水質歷季與環評資料曲線圖

第三章

檢討與建議

第三章 檢討與建議

3-1 監測結果檢討與因應對策

1、監測結果綜合檢討分析

台61線西濱快速公路計畫路線週遭環境以農耕地為主，還包含溪流、漁塭、住宅聚落等環境，計畫區內植物多為低海拔地區普遍分布之種類以及農作物，並無稀特物種，木本植物數量較少，且以防風林為主，而草本植物也是一般的路邊常見物種，整體上並無特別須注意或維護的地方。

本季陸域動物調查共記錄鳥類9目25科58種，哺乳類2目2科3種，兩棲爬蟲類3目5科6種，調查所記錄之物種多數為平原地區以及水域環境中常見種類。

本季調查共記錄黑翅鳶8隻次，於10、11、12月份的調查各發現2、3、3隻成鳥，本季調查於12月份有發現築巢現象，其繁殖情況將會持續觀察。

水域生物調查本季共記錄魚類2目3科4種，底棲生物5目10科11種，所記錄之物種皆為河口常見種類，而這些河口活動的水生生物，其種類族群數量與分布容易受到季節性因子、漲退潮與水中鹽份影響。本季魚類記錄的數量與種類較上一季少，而記錄的底棲生物種類與數量皆比上季多，與去年同季比較時，魚類的數量較去年同季多，種類較去年同季少，底棲生物的數量與種類則較去年同季少，主要與福豐橋河道護岸整修與河床整平等環境變動干擾有關。

水質部份，根據河川污染指標(RPI)計算，福寶橋(舊濁水溪中游)、舊濁水溪下游、第一漢寶橋(漢寶溪上游)、漢寶溪中游測站水質為嚴重污染等級；而裕農橋(舊濁水溪上游)與福豐橋(漢寶溪下游)測站水質則為中度污染等級。

2、監測結果異常現象因應對策

本季為施工中第8季生態監測，鳥類共記錄25科58種，與施工前監測結果相比，施工前3季調查結果共記錄鳥類32科71種，本季監測與施工前3季鳥類調查記錄相同的種類有50種，物種組成相似度為63.3%。指數計算方面，施工前陸域樣線1~5鳥類調查結果歧異度指數分別介於0.94~1.00、0.83~0.89、0.72~0.80、0.66~0.79以及0.80~1.01(表3-1.1)，而本季調查結果顯示，樣線1與樣線2的歧異度指數低於施工前監測之指數值，而樣線3、4與5之歧異度指數則介於或高於施工前之歧異度指數。分析其原因，主要為樣線1、2於本季調查所記錄的種類少於施工前監測所發現的種類，推測與人為干擾增加、天候狀況、農事活動等因素有關。水鳥方面，施工前水鳥樣線1~5調查結果歧異度指數分別介於0.67~0.85、0.67~0.81、0.76~1.01、0.50~0.83以及0.64~0.90(表3-1.2)，本季調查結果顯示僅樣線3之歧異度指數低於施工前之歧異度指數，推測應與種間分布較不平均有關。

施工中監測階段目前共進行8季次的調查，共記錄鳥類32科84種，與施工前監測結果相比，發現物種中有64種相同，兩階段物種組成相似度為70.3%。僅在施工前監測有記錄之物種為黃小鷺、斑尾鷗、台灣夜鷹、赤腰燕、白鵝鴿、遠東樹鷺與白喉文

鳥等7種，而施工中監測新增小水鴨、赤頸鴨、灰胸秧雞、田鷓、反嘴鷓、大濱鷓、紅腹濱鷓、長趾濱鷓、尖尾濱鷓、紅領瓣足鷓、大杓鷓、赤足鷓、小青足鷓、白翅黑燕鷓、燕鷓、銀鷓、大花鷓、白腹鶉、鵲鷓與黃尾鷓等20種。比較兩階段調查的種類差異，主要為候鳥組成的不同，應與調查次數增加有關。

3-2 建議事項

西濱快速公路(台61線)員林大排至西濱大橋新建工程目前為施工階段，由於本季東北季風強勁，容易造成揚塵現象，因此工地車輛出入沿線承商將增加灑水工作頻率，以改善環境品質與植被健康。

表3-1.1、陸域鳥類歧異度指數表(1/5)

樣線 指數	樣線 1											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
歧異度	0.94	0.97	1.00	0.85	1.00	0.84	0.93	0.81	0.82	0.74	0.92	
優勢度	0.16	0.17	0.18	0.24	0.17	0.24	0.19	0.26	0.24	0.28	0.18	
均勻度	0.67	0.65	0.65	0.64	0.71	0.64	0.70	0.62	0.63	0.60	0.69	
豐富度	8.17	10.27	11.18	7.90	9.28	7.07	7.65	7.17	7.06	6.03	7.82	

表3-1.1、陸域鳥類歧異度指數表(2/5)

樣線 指數	樣線 2											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
歧異度	0.89	0.83	0.85	0.96	0.98	0.85	0.86	0.86	0.84	0.73	0.73	
優勢度	0.18	0.21	0.21	0.16	0.16	0.20	0.20	0.21	0.21	0.30	0.27	
均勻度	0.67	0.59	0.59	0.72	0.72	0.66	0.70	0.67	0.67	0.56	0.61	
豐富度	7.28	7.61	8.94	8.28	8.24	6.50	6.03	6.78	6.26	7.06	5.66	

表3-1.1、陸域鳥類歧異度指數表(3/5)

樣線 指數	樣線 3											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
歧異度	0.80	0.72	0.74	0.95	0.92	0.86	0.85	0.88	0.90	0.68	0.75	
優勢度	0.23	0.28	0.26	0.17	0.19	0.23	0.21	0.20	0.21	0.31	0.36	
均勻度	0.62	0.56	0.57	0.76	0.70	0.63	0.66	0.68	0.67	0.55	0.54	
豐富度	6.87	6.18	6.75	7.29	7.48	8.34	6.88	6.90	7.93	5.96	7.86	

表3-1.1、陸域鳥類歧異度指數表(4/5)

樣線 指數	樣線 4										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
歧異度	0.70	0.79	0.66	0.72	0.79	0.89	0.74	0.67	0.79	0.80	0.94
優勢度	0.27	0.27	0.31	0.28	0.24	0.17	0.27	0.30	0.24	0.24	0.16
均勻度	0.61	0.60	0.60	0.65	0.69	0.73	0.68	0.62	0.67	0.64	0.72
豐富度	5.26	6.95	4.83	5.14	5.39	6.28	4.68	4.65	5.68	6.73	7.20

表3-1.1、陸域鳥類歧異度指數表(5/5)

樣線 指數	樣線 5										
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季
歧異度	0.82	0.80	1.01	0.93	0.94	0.94	0.86	0.90	0.88	0.82	1.10
優勢度	0.20	0.23	0.16	0.16	0.16	0.17	0.23	0.19	0.21	0.23	0.13
均勻度	0.70	0.58	0.72	0.76	0.70	0.70	0.66	0.71	0.65	0.59	0.73
豐富度	5.56	7.58	8.59	6.40	7.80	7.66	7.17	6.49	8.32	8.22	10.20

表3-1.2、水鳥歧異度指數表(1/5)

樣線 指數	水 1											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
歧異度	0.85	0.67	0.76	0.98	0.78	1.13	0.85	0.99	0.93	0.89	0.78	
優勢度	0.23	0.31	0.23	0.12	0.27	0.10	0.18	0.14	0.16	0.18	0.22	
均勻度	0.68	0.62	0.71	0.90	0.68	0.82	0.76	0.79	0.79	0.74	0.72	
豐富度	7.18	4.53	4.57	5.06	5.63	8.64	5.89	7.00	5.92	6.58	5.00	

表3-1.2、水鳥歧異度指數表(2/5)

樣線 指數	水 2											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
歧異度	0.67	0.81	0.68	0.84	0.68	0.83	0.93	0.82	0.67	0.77	0.82	
優勢度	0.30	0.19	0.28	0.19	0.32	0.18	0.15	0.19	0.32	0.20	0.19	
均勻度	0.67	0.78	0.75	0.84	0.68	0.87	0.84	0.82	0.65	0.81	0.82	
豐富度	4.24	4.02	2.90	4.79	4.09	4.10	5.95	4.72	4.54	4.32	4.79	

表3-1.2、水鳥歧異度指數表(3/5)

樣線 指數	水 3											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
歧異度	0.80	0.76	1.01	0.86	0.98	0.88	0.82	0.83	0.84	0.85	0.73	
優勢度	0.24	0.23	0.12	0.22	0.15	0.22	0.26	0.22	0.22	0.24	0.34	
均勻度	0.68	0.67	0.84	0.73	0.78	0.66	0.63	0.60	0.61	0.66	0.55	
豐富度	6.06	4.83	5.78	5.90	6.75	7.03	6.10	7.06	7.24	6.56	6.40	

表3-1.2、水鳥歧異度指數表(4/5)

樣線 指數	水 4											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
歧異度	0.83	0.69	0.50	0.69	0.97	0.98	0.72	0.67	0.95	0.87	0.76	
優勢度	0.18	0.36	0.51	0.31	0.16	0.17	0.32	0.31	0.16	0.21	0.30	
均勻度	0.80	0.59	0.48	0.57	0.72	0.72	0.51	0.51	0.69	0.73	0.56	
豐富度	3.84	4.29	2.96	5.09	6.90	7.10	7.02	5.54	7.02	4.72	6.38	

表3-1.2、水鳥歧異度指數表(5/5)

樣線 指數	水 5											
	98年 第2季	98年 第3季	98年 第4季	99年 第1季	99年 第2季	99年 第3季	99年 第4季	100年 第1季	100年 第2季	100年 第3季	100年 第4季	
歧異度	0.90	0.83	0.64	0.75	1.05	0.93	0.57	0.66	0.89	0.93	0.87	
優勢度	0.17	0.24	0.39	0.28	0.11	0.17	0.44	0.34	0.18	0.15	0.23	
均勻度	0.78	0.70	0.62	0.59	0.85	0.73	0.55	0.56	0.76	0.76	0.69	
豐富度	4.66	5.26	4.01	6.21	6.25	6.65	3.77	5.09	5.53	5.62	6.39	

參考文獻

參考文獻

- 王漢泉。2002。台灣河川水質魚類指標之研究。環境檢驗所環境調查研究年報。9:207-236。
- 王騰崇。2001。大鵬灣竹片上附生藻類生產力之時空變化。國立中興大學植物學系研究所碩士論文。
- 水利規劃試驗所。2004。河川情勢調查作業要點(草案)93.11.04版。經濟部水利規劃試驗所。27頁。
- 田志仁、汪碧涵。2004。淡水生物多樣性調查方法與評估指標。環境檢驗季刊 50:14-21。
- 行政院環保署。2003。動物生態評估技術規範。行政院環境保護署。134頁。
- 吳俊宗、周晉文。1999。河川水質污染之藻類指標--基隆河指標生物調查方法(實用操作)。行政院環境保護署研究報告。
- 吳俊宗等，1998。淡水河系生物相調查及生物指標手冊建立。行政院環境保護屬。
- 吳俊宗、徐明光。1989。淡水河口的浮游藻社會。科學月刊20(12):899-901頁。
- 吳俊宗。1986。藻類與環境。藻類之研究與應用研討會論文集。151頁。
- 李榮祥。2001。台灣賞蟹情報。大樹文化事業股份有限公司。174頁。
- 研習會手冊，台灣省特有生物研究保育中心，83-93頁
- 沈世傑主編。1993。台灣魚類誌。國立台灣大學動物學系印行。960頁。
- 林曜松、梁世雄。1996。淡水魚資源調查手冊。行政院農委會。264頁。
- 林幸助、于淑芬。2007。溪流中的藻類。科學發展417:7-9。
- 邵廣昭、陳靜怡。2004。魚類圖鑑。遠流出版社。444頁。
- 施志昫、游祥平。1998。台灣的淡水蝦。國立海洋生物博物館。144頁。
- 洪正中。1988。台灣河川污染生物指標及水質等級評估之研究。聯銀出版社。
- 胡鴻鈞、李堯英、魏印心、朱蕙忠、陳嘉佑、施之新。1981。中國淡水藻類。上海科學技術出版社。525頁。
- 徐明光。1999。台灣的淡水浮游藻(I)-通論及綠藻(1)。台灣博物館。148頁。
- 經濟部水利署第二河川局網站<http://www.wra02.gov.tw/river2.asp>
- 梁象秋、方紀祖、楊和荃。1998。水生生物學(形態與分類)。水產出版社。689頁。
- 陳義雄、方力行。1999。台灣淡水及河口魚類誌。國立海洋生物博物館籌備處。256頁。
- 陳榮宗、何平合、李訓煌。2003。外來種淡水魚類及蝦類在台灣河川之分布概要。特有生物研究。5(2):33-46。
- 葉榮昌。2004。寶山水庫浮游動物相季節變化之研究。國立新竹師範學院數理教育研究所碩士論文。
- 曾晴賢。2003。河溪生態工法應有的觀念與作法-從生態角度思考。生態工法

- 培訓講習會。
- 雷淇祥。1989。淡水河口沼澤生態系的動物性浮游生物。科學月刊 p.904-904。
- 鄭重、李少菁、許振祖。1992。海洋浮游生物學。水產出版社。基隆，661頁
- 楊平世。1992。水棲昆蟲生態入門。台灣省政府教育廳。
- 張明雄。1999。淡水魚類資源調查方法與技術。野生動物資源調查方法研習會手冊。台灣省特有生物研究保育中心。94頁。
- 張文炳。1991。浮游動物。農委會漁業特刊 27:75-703。
- 張寶蓮。1976。蘭潭浮游生物之研究。嘉義師專學報，7:141-172。
- 郭世榮、賴弘智、李益榮。1992。高雄港沿岸海域動物性浮游生物相之研究。嘉義農專學報 30:91-106。
- 趙大衛。2000。貝類生物指標在環境變遷及污染評估上的應用。環境教育季刊42：67-76。
- Carr, G.M., Duthie, H.C. and Taylor, W.D. 1997. Models of aquatic plant productivity: a review of the factor that influence growth. *Aquat. Bot.* 59:195-215.
- Hansson.L.-A. 1992. Factors regulating periphytic algal biomass. *Limnol. Oceanogr.* 37:322-328.
- Krebs, C. 1999. *Ecological Methodology*, 2nd ed. Addison-Welsey Educational Publishers, Inc., Menlo Park. 620pp.
- Krebs, C. J. 1998. *Ecological methodology*. Harper Collins Publishing, Inc., New York.
- Magurran, A.E. 1988. *Ecological diversity and its measurement*. Croom Helm Ltd, London.
- Merrit, R. W. and K. W. Cummins. 1996. *An introduction to the Aquatic Insects of North America*. Hunt Publishing company.
- Sládeček V. 1983. Rotifers as indicators of water quality. *Hydrobiologia* 100: 169-201.
- Takaaki Yamagishi. 1992. Plankton algae in Taiwan (Formosa). Uchida Rokakuho.
- Weitzel, R.L. 1979. Periphyton measurements and ap placations. In:Weitzel, R.L.(ed) *Methods and measurements of periphyton communities:a review*.ASTM STP 690. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, p3-33.
- Wu, J.-T. 1999. A generic index of diatom assemblages as bioindicator of water pollution in the Keelung River of Taiwan. *Hydrobiologia* 397:79-87.
- Yamagishi Takaaki. 1992. Plankton algae in Taiwan (Formosa). Uchida Rokakuho.
- 川合禎次。1988。日本產水生昆蟲檢索圖說。東海大學出版社。
- 水野壽彥。1977。日本淡水プランクトン図鑑。保育社。353頁。
- 廣瀨弘幸、山岸高旺。1991。日本淡水藻図鑑。内田老鶴圃。933頁